DE

Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung
ReposoTech Silicone ist eine sterile Saugkompresse für die Behandlung von mittelstark bis stark exsudierenden, akuten und chronischen Wunden. Dank der Silikonwundkontaktschicht lässt sie sich einfach anlegen und wahren schmerzlos, atraumatisch entfernen. Die Saugkompresse nimmt Exsudat auf und bindet es.

Zusammensetzung
ReposoTech Silicone besteht aus einer Saugkompresse aus Zellulose und superabsorbierendem Polyacrylat, die Exsudat aufnehmen und binden kann. Die der Wunde zugewandte Seite ist mit einer Silikonschicht bedeckt, die ein einfaches Anlegen der Saugkompresse ermöglicht und das Anhaften an der Wunde verhindert. Der Verbandstoff besteht aus einem grünen Polypropylen-Vlies, das hydrophob, aber gleichzeitig luftdurchlässig ist und den Gasaustausch ermöglicht.

Eigenschaften und Wirkungsweise
ReposoTech Silicone nimmt Exsudat auf und bindet es in der Saugkompresse. Die silikonhaltige Silikonwundkontaktschicht verhindert ein Verstopfen der Saugkompresse und erleichtert das Anlegen. Der Verbandwechsel erfolgt atraumatisch und nahezu schmerzlos.

Zweckbestimmung
ReposoTech Silicone ist eine sterile, superabsorbierende Saugkompresse für den Einmalgebrauch mit einer Silikonwundkontaktschicht zur Langzeitbehandlung verletzter Haut bei akuten und chronischen Wunden mit einer mittelstarken bis starken Exsudation. Das Produkt wird durch medizinische Fachkräfte ausschließlich bei Erwachsenen im klinischen Umfeld und unter Beachtung der Hygiene- und Pflege angewandt und kann mit lokaler Antiseptika, primären und sekundären Wundauflagen oder Kompressionsbinden kombiniert werden.

Indikationen
ReposoTech Silicone eignet sich für die Behandlung von mittelstark bis stark exsudierenden Wunden: akute Wunden (z. B. traumatische Wunden, Verbrennungen, postoperative Wunden) und chronische Wunden (Ulzera, Dekubitalgeschwüre, Tumorwunden, diabetisches Fußsyndrom).

Anwendungshinweise
- Die Wunde mit physiologischer Kochsalzlösung oder gemäß ärztlicher Anweisung reinigen.
- Wählen Sie die Saugkompresse entsprechend der Wundgröße aus, sodass sie die Wundränder um ca. 1 – 2 cm überlappt. Die Saugkompresse nicht zuschneiden.
- Nach dem Spülen der Wunde und vor dem Auftragen der Saugkompresse dafür sorgen, dass der Bereich um die Wunde mit Tupfern trockengetupft wird, damit die Haftung gewährleistet ist.
- Die Schutzfolien entfernen, die Saugkompresse mit der haftenden Seite auf der Wundpositionieren, sodass die graue Seite der Wunde abgewandt ist.
- Die Saugkompresse 2 – 3 Minuten mit der Hand leicht andrücken und dabei den geeigneten Produkt fixieren oder bei Bedarf nach ärztlicher Anweisung entsprechenden Verband anlegen.
- Die Saugkompresse kann – je nach Zustand der Wunde und geltendem klinischem Protokoll – bis zu 5 Tage auf der Wunde verbleiben. Bei Wundinfektion oder notwendig, wenn dieser Kleinich angezeigt ist oder wenn Exsudat den Rand der Saugkompresse erreicht.

Kontraindikationen
Verwenden Sie ReposoTech Silicone nicht bei einer Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen
Die Saugkompresse kann nicht zugeschnitten werden.
- Vor der Behandlung eines infizierten Wunden muss von einem Arzt eine klinische Diagnose erstellt werden. Die Behandlung mit ReposoTech Silicone kann eine Wundbehandlung der Begleitinfektion ergänzen, ersetzt aber nicht die systemische Anziehen für eine infektion gilt, muss diese Infektion mit einer geeigneten systemischen Behandlung behandelt werden. Der Verband sollte gewechselt werden kann.
- Bei Verdacht auf Unverträglichkeit ist die Anwendung abzubrechen.
- Es sind keine Daten verfügbar, die die Anwendung dieser Saugkompresse bei schwangeren Patientinnen, stillenden Müttern, Säuglingen, Kindern, Schwangeren oder stillenden Frauen unterstützen, und es liegen ebenfalls keine Daten vor, die dem widersprechen. Die Saugkompresse sollte bei diesen Patientengruppenbesonders daher nur mit Vorsicht und aufgrund der Empfehlung eines Arztes verwendet werden.
- Es ist nicht empfehlenswert, die Applikation auf unreiner Haut zu vermeiden, z. B. bei Wunden an den Füßen.
- Die Saugkompresse, die in Peelpackungen aus Papier/Papier verpackt sind: Die Siegelnaht der Peelpackung enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen auslösen kann.

Die Wiederverwendung eines für den Einmalbedarf vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Werden Infektionen verursachen.

Nebenwirkungen
Erhöhte Exsudatmenge, Mazeration, verstärkter Schmerz, Anhaften der Saugkompresse an der Wunde, Juckreiz, Brennen, Ödeme, mehrfache Infektionen, rötung, Hautausschlag, Blasen, Erythem. Wenn eine dieser Nebenwirkungen auftritt, ziehen Sie einen Arzt hinzu.

Meldung von Vorkommnissen
Wenn Sie Patienten/Anwendern/Dritten in der Europäischen Union und Ländern mit ähnlichen Vorschriften (Verordnung (EU) 2017/745) über ein Medizinprodukt(e) während der Verwendung oder infolge der Verwendung dieses Produkts ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, muss dies dem Hersteller bzw. seinem Bevollmächtigten und der nationalzuständigen Behörde gemeldet werden.

Produktentsorgung
Um das Risiko potenzieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sollten Wegwerfkomponenten des Medizinprodukts gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für die Entsorgung von medizinischen Abfällen und Anweisungen zur Infektionsprävention entsorgt werden. Das Medizinprodukt mit dem Hausmüll entsorgen.

Lagerung
Stand der Information: 2020-03-11

AT — PAUL HARTMANN Ges.m.b.H. · 2355 Wiener Neudorf
CH — IVF HARTMANN AG · 8212 Neuhausen

EN

Instructions for use

Product description
ReposoTech Silicone is a sterile dressing for the treatment of moderately to highly exuding, acute and chronic wounds. Thanks to the silicone wound contact layer it can be applied easily and painless, atraumatic removal. The absorbent pad absorbs and retains the exudate.

Composition
ReposoTech Silicone comprises an absorbent pad made from cellulose and superabsorbent polymer (SAP) for the absorption and retention of exudate. On the wound side it is covered with a silicone layer to facilitate application of the dressing and promote non-adherence to the wound. The backing material is made of green-coloured, polypropylene nonwoven, which is hydrophobic but permeable to air and allows for gas exchange.

Properties and mode of action
ReposoTech Silicone absorbs exudate and retains it in the absorbent pad. The micro-adherent, silicone wound contact layer prevents the dressing from slipping and facilitates its application. The dressing changes are carried out atraumatically and almost painlessly.

Intended purpose
ReposoTech Silicone is a single use sterile superabsorbent dressing with a silicone interface for long-term treatment of injured skin, acute and chronic wounds, with moderate to high levels of exudation. It is used on adults only, by healthcare professionals in clinical or homecare environments and can be combined with local antiseptics, primary and secondary dressings and under compression.

Indications
ReposoTech Silicone is suitable for the treatment of wounds with moderate to high levels of exudate: acute wounds (traumatic wounds, burns, post-operative wounds) and chronic wounds (ulcers, pressure sores, tumor wounds, diabetic feet).

Mode of application
- Clean the wound using a physiological solution or as instructed by a clinician.
- Select a suitable dressing size for the wound making sure that the dressing overlaps the margins of the wound by approx. 1 – 2 cm. Do not cut the dressing.
- Before applying the dressing, after rinsing the wound, make sure that the area around the wound is dry using swabs to ensure that the dressing adheres.
- Remove the protective films. Place the dressing with the adherent side onto the wound, so that the green side faces away from the wound.
- Secure the dressing using a 2-Pha-Soft bandage or any other suitable fixation, or, if needed for, with compression bandages as instructed by a clinician.
- A dressing can remain on the wound for up to 5 days, depending on the condition of the wound and the established clinical protocol. The dressing must be changed if clinically indicated, if infection occurs or if exudate reaches the edges.

Contraindications
Do not use ReposoTech Silicone in case of hypersensitivity to any of its components.

Special precautions
The wound dressing may not be cut to size.
- Before treating a wound infection or impairment, a clinician has to be consulted to establish a clinical diagnosis. Treatment with ReposoTech Silicone cannot replace a causal treatment of the underlying infection. If signs of local infection or systemic infection, the infection needs to be controlled with appropriate treatment before this dressing can be used.
- In all cases, follow the established clinical protocol.
- In the absence of available data regarding the use of this dressing on sensitive population groups such as infants, children, pregnant or nursing women, and in the absence of data to the contrary, on these population groups this dressing should be used with caution and following a clinician's recommendation.
- It is not recommended to avoid the dressing, e.g. in the case of wounds on the feet.
- For dressings which are packed in paper-paper-peel packs: The sealed seam of the peel-pack contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions!

Reusing a single-use medical device creates risks. Reprocessing devices in order to reuse them, may seriously damage their integrity and their performance. Infections or cross-infections may occur as a result of reprocessing.

Side effects
Increased exudate, maceration, increased pain, adherence of the dressing to the wound, itching, burning, oedema, multiple infections, rubor, skin rash, blisters, erythema. If any of these side effects occur, consult a clinician.

Incident reporting
For a patient/user/third party in the European Union and in countries with identical regulatory regime (Regulation (EU) 2017/745) where a medical device(s) has caused, or is notwordig, worn dieser klinisch angezeigt ist oder wenn Exsudat den Rand der Saugkompresse erreicht.

Kontraindikationen
Verwenden Sie ReposoTech Silicone nicht bei einer Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen
Die Saugkompresse kann nicht zugeschnitten werden.
- Vor der Behandlung eines infizierten Wunden muss von einem Arzt eine klinische Diagnose erstellt werden. Die Behandlung mit ReposoTech Silicone kann eine Wundbehandlung der Begleitinfektion ergänzen, ersetzt aber nicht die systemische Anziehen für eine infektion gilt, muss diese Infektion mit einer geeigneten systemischen Behandlung behandelt werden. Der Verband sollte gewechselt werden kann.
- Bei Verdacht auf Unverträglichkeit ist die Anwendung dieser Saugkompresse bei schwangeren Patientinnen, stillenden Müttern, Säuglingen, Kindern, Schwangeren oder stillenden Frauen unterstützen, und es liegen ebenfalls keine Daten vor, die dem widersprechen. Die Saugkompresse sollte bei diesen Patientengruppenbesonders daher nur mit Vorsicht und aufgrund der Empfehlung eines Arztes verwendet werden.
- Es ist nicht empfehlenswert, die Applikation auf unreiner Haut zu vermeiden, z. B. bei Wunden an den Füßen.
- Die Saugkompresse, die in Peelpackungen aus Papier/Papier verpackt sind: Die Siegelnaht der Peelpackung enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen auslösen kann!

Die Wiederverwendung eines für den Einmalbedarf vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Werden Infektionen verursachen.

Nebenwirkungen
Erhöhte Exsudatmenge, Mazeration, verstärkter Schmerz, Anhaften der Saugkompresse an der Wunde, Juckreiz, Brennen, Ödeme, mehrfache Infektionen, rötung, Hautausschlag, Blasen, Erythem. Wenn eine dieser Nebenwirkungen auftritt, ziehen Sie einen Arzt hinzu.

Meldung von Vorkommnissen
Wenn Sie Patienten/Anwendern/Dritten in der Europäischen Union und Ländern mit ähnlichen Vorschriften (Verordnung (EU) 2017/745) über ein Medizinprodukt(e) während der Verwendung oder infolge der Verwendung dieses Produkts ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, muss dies dem Hersteller bzw. seinem Bevollmächtigten und der nationalzuständigen Behörde gemeldet werden.

Produktentsorgung
Um das Risiko potenzieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sollten Wegwerfkomponenten des Medizinprodukts gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für die Entsorgung von medizinischen Abfällen und Anweisungen zur Infektionsprävention entsorgt werden. Das Medizinprodukt mit dem Hausmüll entsorgen.

Lagerung
Stand der Information: 2020-03-11

AT — PAUL HARTMANN Ges.m.b.H. · 2355 Wiener Neudorf
CH — IVF HARTMANN AG · 8212 Neuhausen

FR

Instructions d'utilisation

Description du produit
ReposoTech Silicone est un pansement stérile destiné au soin des plaies modérément à abondamment exsudatives, aiguës et chroniques. La couche silicone au contact de la plaie permet une application aisée et un retrait atraumatique et presque indolore. Le coussin absorbant absorbe et retient les exsudats.

Composition
ReposoTech Silicone est un pansement composé d'un coussin absorbant à base de cellulose et de polyacrylate superabsorbant, permettant l'absorption et la rétention des exsudats. Il est recouvert côté plaie d'une couche silicone pour faciliter l'application du pansement et favoriser la non-adhérence à la plaie. Le côté du pansement opposé à la plaie est recouvert d'un non-tissé en polypropylène de couleur verte, hydrophobe mais perméable à l'air et permettant les échanges gazeux.

Propriétés et mode d'action
ReposoTech Silicone absorbe les exsudats et les retient dans le coussin absorbant. L'interface silicone, micro-adhérente, avec le pansement en glisser et facilite son application. Les renouvellements de pansement se déroulent de manière atraumatique et presque indolore.

Utilisation prévue
ReposoTech Silicone est un pansement superabsorbant stérile à usage unique avec une interface silicone pour le traitement à long terme des plaies cutanées aiguës et chroniques, avec des niveaux modérés à élevés d'exsudats. Il est utilisé uniquement chez l'adulte par des professionnels de santé en milieu clinique ou à domicile et il peut être associé avec des antiseptiques locaux, des pansements primaires et secondaires ou en contention.

Indications
ReposoTech Silicone est indiqué pour le traitement des plaies présentant des exsudats modérés à abondants : plaies aiguës (plaies traumatiques, brûlures, plaies postopératoires) et plaies chroniques (ulcères, escarres, plaies tumorales, pieds diabétiques).

Mode d'application
- Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique ou selon la prescription médicale.
- Choisir la taille du pansement adaptée à la plaie en veillant à ce que ce dernier dépasse d'environ 1 à 2 cm les marges de la plaie. Ne pas découper le pansement.
- Avant de poser le pansement, après rinçage de la plaie, veiller à bien sécher le pourtour de la plaie à l'aide de compresses afin de pouvoir garantir l'adhérence du pansement.
- Retirer les feuillets protecteurs. Poser le pansement face adhérente côté plaie, de manière à ce que la face verte soit opposée à la plaie.
- Fixation à l'aide d'un pansement 2-Pha-Soft ou autre, d'une bande type Peha-haft ou tout autre système de fixation adapté, ou le cas échéant avec des bandes de compression selon la prescription médicale.
- Le pansement peut rester jusqu'à 5 jours en place sur la plaie en fonction de l'état de la plaie et du protocole clinique instauré. Le renouvellement du pansement doit s'effectuer si des signes cliniques l'imposent ou lorsque les exsudats apparaissent au niveau des bords du pansement.

Contre-indications
Ne pas utiliser ReposoTech Silicone en cas d'hypersensibilité à l'un des composants.

Précautions particulières
Le pansement ne doit pas être découpé.
- Avant tout traitement d'une plaie présentant des problèmes de cicatrisation, il est nécessaire de consulter un médecin afin qu'il établisse un diagnostic clinique. Le traitement avec ReposoTech Silicone ne remplace pas un traitement étiologique d'une retard de cicatrisation. En présence de signes cliniques d'infection, l'utilisation de ce pansement nécessite la mise en place préalable de l'infection par un traitement approprié.
- Dans tous les cas, suivre le protocole clinique instauré.
- En l'absence de données disponibles sur l'utilisation de ce pansement sur des populations sensibles telles que les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes et en l'absence de données contraires, l'utilisation de ce pansement sur ces populations doit se faire avec précaution et en suivant les recommandations d'un médecin.
- Il n'est pas recommandé de se tenir debout sur le pansement, par exemple en cas de plaies aux pieds.
- Pour les pansements conditionnés en sachets pelables papier-papier : le scellage (bande bleue) du sachet pelable contient du latex naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques !

La réutilisation d'un dispositif médical à usage unique est dangereuse. Le traitement des dispositifs en vue de leur réutilisation peut grandement nuire à leur intégrité et à leurs performances. Des infections peuvent en résulter.

Effets secondaires
Augmentation des exsudats, maceration, augmentation de la douleur, adhérence du pansement à la plaie, démangeaison, brûlure, œdème, ulcération multiple, avulsion de la peau, phlyctène, erythème. En cas d'apparition d'un de ces effets indésirables, consulter un médecin.

Signalement des incidents
Pour un patient/utilisateur / tiers dans l'Union européenne et dans les pays ayant un régime réglementaire identique (Règlement (UE) 2017/745/UE sur les dispositifs médicaux) : si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou suite à son utilisation, un incident grave se produit, veuillez le signaler au fabricant et/ou à son représentant légal autorisé et à votre autorité nationale.

Élimination du produit
Afin de réduire le risque d'infections potentielles ou de pollution environnementale, les composants jetables du dispositif médical doivent être éliminés conformément aux lois, réglementations et directives locales relatives à l'élimination de prévention des infections. Éliminer le dispositif médical avec les ordures ménagères.

Date de dernière révision de la notice : 2020-03-11

FR — Lab. PAUL HARTMANN S.à.r.l. · Chemicos – 67607 Selestat CEDEX

NL

Gebruiksaanwijzing

Productbeschrijving
ReposoTech Silicone is een steriel kompres bedoeld voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende, acute en chronische wonden. De silicoenlaag die in aanraking komt met de wond, zorgt voor een gemakkelijke aanbrenging en atraumatische verwijdering zonder pijnlijnloos en atraumatisch kan worden verwijderd. Het absorberende wondkussen neemt exsudaat op en houdt het vast.

Samenstelling
ReposoTech Silicone bestaat uit een absorberend wondkussen gemaakt van cellulose en superabsorberend polyacrylaat voor de absorptie en retentie van exsudaat. De wondzijde is bedekt met een siliconenlaag die het gemakkelijk aanbrengen van het verbandmateriaal en ervoor te zorgen dat het zich niet aan de wond hecht. De bovenkant van het wondkussen is gemaakt van groen, niet-geweven polypropyleen. Dit laatste is hydrofoob maar wateradstrant maar luchtdoorlatend is, waardoor gaswisseling mogelijk is.

Eigenschappen en werking
ReposoTech Silicone absorbeert exsudaat en houdt het vast in het absorberende wondkussen. De micro-klevende, siliconenlaag voorkomt dat het kompres verschuift en zorgt ervoor dat het gemakkelijk kan worden aangebracht. De kompresvervangingen worden bijna atraumatisch en pijnloos uitgevoerd.

Beoogd gebruik
ReposoTech Silicone is een steriel superabsorberend kompres met een siliconenlaag voor eenmalig gebruik voor de langdurige behandeling van beschadigde huid bij acute en chronische wonden. Het wordt uitsluitend gebruikt bij volwassenen door medische professionals in een klinische omgeving of in de thuiszorg en kan worden gecombineerd met lokale antiseptica, primaire en secundaire wondverbanden en compressie.

Indicaties
ReposoTech Silicone is geschikt voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende wonden: acute wonden (traumatische wonden, brandwonden, postoperatieve wonden) en chronische wonden (ulcera, doorlopwonden, tumorwonden, diabetische voeten).

Wijze van aanbrengen
- Maak de wond schoon met behulp van een fysiologische oplossing of volgens de instructies van een arts.
- Kies een geschikte kompresmaat voor de wond; zorg er daarbij voor dat het kompres de wondranden met 1 – 2 cm overlapt. Het kompres niet op maat knippen.
- Voor het aanbrengen van het kompres, na het spoelen van de wond, ervoor zorgen dat het gebied rond de wond met watertesten wordt afgedroogd voordat het kompres kan worden aangebracht, anders hecht het kompres niet goed.
- Verwijder de beschermfilm. Plaats het kompres met de kleverige zijde op de wond, met de groene zijde van de wond af.
- Fixeer het kompres met bijv. een Peha-haft verbandfixatie of een andere geschikt fixatiemiddel, of, indien nodig, met compressieverbanden volgens de instructies van een arts.
- Het kompres kan maximaal 5 dagen op de wond blijven, afhankelijk van de conditie van de wond en de toegepaste klinische wondbehandeling. Het kompres moet vervangen worden indien klinisch geïndiceerd of wanneer het exsudaat de rand van het kompres bereikt.

Contra-indicaties
Gebruik ReposoTech Silicone niet in geval van overgevoeligheid voor één of meerdere bestanddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen
Het kompres mag niet op maat geknipt worden.
- Raadpleeg een arts voordat een infectieuze wonden voordat u een chronische wond gaat behandelen. Een behandeling met ReposoTech Silicone is geen vervanging voor causale therapie van een infectie. Als er klinische tekenen van een lokale infectie zijn, moet de infectie worden behandeld met een adequate behandeling voordat dit kompres kan worden gebruikt.
- Volg in alle gevallen de gestandaardiseerde klinische protocollen op.
- Bij gebrek aan beschikbare gegevens over het gebruik van kompres bij kwetsbare bevolkingsgroepen zoals zuigelingen, kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, zoals hierover, en bij gebrek aan gegevens die het tegendeel hiervan bewijzen, dient dit kompres bij deze bevolkingsgroepen voorzichtig gebruikt te worden en op advies van een arts.
- Het wordt niet aanbevolen op het kompres te staan, bijvoorbeeld bij wonden aan de voeten.
- Voor kompressen die zijn verpakt in papieren peelpacks: de sealnaad van de peelpack bevat natuurlijke rubberlatex en kan allergische reacties veroorzaken!

Hergebruik van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik kan gevaarlijk zijn. Het herwerken van hulpmiddelen voor hergebruik kan de integriteit en de prestatie van de producten ernstig schaden. Informatie op aanvraag beschikbaar.

Bijwerkingen
Toenemend exsudaat, maceratie, verhoogde pijn, wondverklevingj, jeuk, brandend gevoel, oedeem, meerdere zweren, huiduitslag, blaarvorming, erythemen. Raadpleeg een arts als een van deze bijwerkingen optreedt.

Incidenten melden
Voor patiënten/gebruikers/derde partijen in de Europese Unie en in landen met dezelfde regelgeving (Verordening (EU) 2017/745/EU) inzake medische hulpmiddelen) gelde: ernstige incidenten die zich in verband met het gebruik van het hulpmiddel of als een resultaat van het gebruik van het hulpmiddel hebben plaatsgevonden, moeten gemeld bij de fabrikant en/of de bevoegde vertegenwoordiger en van nationale autoriteit.

Afvoeren van het product
Om het risico op infectiegevaar of milieuvervuiling te minimaliseren, moeten voor de wegwerpcomponenten van het medisch hulpmiddel de procedures voor afvoer worden gevolgd overeenkomstig de geldende lokale wetgeving, richtlijnen en voorschriften voor infectiepreventie. Voer het medisch hulpmiddel af met het huishoudelijk afval.

Datum van herziening van de tekst: 2020-03-11

BE — N.V. PAUL HARTMANN S.A. · 1480 Saintes/Sint-Renelde
NL — PAUL HARTMANN B.V. · 6546 BC Nijmegen

IT

Istruzioni per l'uso

Descrizione del prodotto
ReposoTech Silicone è una compressa sterile per il trattamento delle ferite superficiali da moderatamente a fortemente essudative, acute e croniche. Lo strato di silicone a contatto con la ferita ne consente la facile applicazione, riduce la rimozione quasi indolore e atraumatica. La compressa assorbente cattura l'essudato e lo trattiene con efficacia.

Composizione
La compressa ReposoTech Silicone è una compressa assorbente combinata composta di cellulosa e polisaccaride superassorbente, per l'assorbimento e la ritenzione dell'essudato. Sul lato della ferita è coperta con uno strato in silicone al fine di facilitare l'applicazione sulla ferita e ridurre al minimo l'adesione alla ferita. Il rivestimento della compressa è in tessuto non tessuto in polipropilene di colore verde, idrofobo ma permeabile all'aria, che consente gli scambi gassosi.

Proprietà e modo di azione
ReposoTech Silicone assorbe l'essudato e lo trattiene nella compressa assorbente. L'interfaccia in silicone, a microadesività controllata, facilita l'applicazione e ne facilita l'applicazione. Le sostituzioni della compressa si atraumatica e quasi indolore.

Destinazione d'uso
ReposoTech Silicone è una compressa superassorbente sterile monouso con un'interfaccia in silicone per il trattamento a lungo termine di ferite acute e croniche. Può essere usata da medici o da personale qualificato, in ambienti clinici o domestici per pazienti adulti da moderati sanitari in ambienti clinici o domestici e può essere combinata con antisettici locali, compresse primarie e secondarie e sotto compressione.

Indicazioni
ReposoTech Silicone è indicato per il trattamento di ferite con livelli di essudato da moderati ad alti: ferite acute (ferite traumatiche, ustioni, ferite post-operatorie) e ferite croniche (ulcere da pressione, piede diabetico, ferite tumorali).

Modalità di applicazione
- Pulire la ferita utilizzando una soluzione fisiologica o seguendo le indicazioni fornite da un medico.
- Scegliere una compressa di dimensione adeguata in modo che ricopra la ferita estendendosi leggermente oltre i suoi margini di ca. 1-2 cm. Non tagliare la compressa.
- Prima di applicare la compressa, dopo aver risciacquato la ferita, fare in modo che l'area circostante sia asciutta utilizzando dei tamponi per garantirne l'adesione.
- Staccare le pellicole protettive. Posizionare la compressa sulla ferita in modo che il lato adesivo sulla ferita, in modo che il lato di colore verde sia rivolto sul lato opposto.
- Fissare la compressa con una benda 2-Pha-Soft o con qualsiasi altro mezzo di fissaggio idoneo, oppure, se necessario, applicare bende compressive seguendo le indicazioni fornite da un medico.
- La compressa può rimanere applicata sulla ferita per massimo 5 giorni, a seconda dello condizione della ferita e del protocollo clinico stabilito. La compressa deve essere sostituita in base alle indicazioni fornite da un medico o quando l'essudato raggiunge il bordo della compressa.

Controindicazioni
Non utilizzare ReposoTech Silicone in caso di ipersensibilità a uno dei suoi componenti.

Precauzioni generali
La compressa non può essere tagliata a misura.
- Prima di trattare una ferita che presenta segni di infezione, è necessario consultare un medico per definire una diagnosi clinica. Il trattamento con ReposoTech Silicone non può sostituire il trattamento eziologico per la ferita, ma ne integra il trattamento della ferita. Se sono presenti segni clinici d'infezione, questi ultimi deve essere controllata con adeguato trattamento prima di utilizzare questa compressa.
- In tutti i casi seguire il protocollo clinico in uso.
- In assenza di dati disponibili sull'utilizzo della tale compressa su gruppi di popolazioni sensibili come neonati, bambini, donne in gravidanza o in fase di allattamento, e in assenza di dati contrari a questi gruppi di popolazione deve essere impiegata con cautela su tali soggetti, seguendo le indicazioni di un medico.
- In caso di ferite ai piedi, è sconsigliabile camminare sopra la compressa al peso del corpo in posizione eretta.
- Per compresse confezionate in peel-pack carta-carta: La confezione interna è sigillata con lattice naturale, il quale può produrre reazioni allergiche!

Il riutilizzo di un dispositivo medico monouso è pericoloso. Riprocessare i dispositivi al fine di un riutilizzo potrebbe danneggiare gravemente la loro integrità e le loro prestazioni. Informazioni disponibili su richiesta.

Effetti collaterali
Aumento dell'essudato, maceration, aumento del dolore, compressa attaccata alla ferita, prurito, bruciore, edema, ulcerazione multipla, avulsione cutanea, vescica, eritema. In caso di comparsa di uno di tali effetti collaterali, consultare un medico.

Segnalazione di incidenti
Per un paziente/utilizzatore/terzi nell'Unione europea e in paesi con regime normativo identico (Regolamento 2017/745/UE sui dispositivi medici), se, durante l'uso del presente dispositivo o a seguito del suo utilizzo, si è verificato un incidente grave, segnalare quest'ultimo al fabbricante e/o ai suoi rappresentanti autorizzati e alla relativa autorità nazionale.

Smaltimento del prodotto
Per ridurre il rischio di potenziali pericoli di infezione o di inquinamento ambientale, i componenti monouso del dispositivo medico devono essere smaltiti secondo le disposizioni di smaltimento in conformità alle leggi locali vigenti e a norme, regolamenti e standard di prevenzione delle infezioni. Smaltire i dispositivi medici con i rifiuti domestici.

Data di revisione del testo: 2020-03-11

IT — PAUL HARTMANN S.p.A. · 37139 Verona

ES

Instrucciones de uso

Descripción del producto
ReposoTech Silicone es un apósito estéril para el tratamiento de heridas agudas y crónicas con niveles de exudado moderados a abundantes. La capa de silicona en contacto con la herida permite una aplicación sencilla y una retirada atraumática y casi indolora. La almohadilla absorbente absorbe y retiene el exudado.

Composición
ReposoTech Silicone incluye una almohadilla absorbente de celulosa y polacrilato superabsorbente para la absorción y la retención de exudado. Por el lado de la herida está recubierta con una capa de silicona que facilita la aplicación del apósito y evita la adhesión a la herida. La cara posterior del apósito está fabricada en polipropileno no tejido de color verde. El material es hidrófobo pero permeable al aire, por lo que permite el intercambio de gases.

Características y principio de acción
ReposoTech Silicone absorbe y retiene el exudado en la almohadilla absorbente. La superficie de silicona microadherente impide que el apósito se desplace y facilita la aplicación. El apósito se puede cambiar prácticamente sin dolor ni molestias, de forma atraumática.

Uso previsto
ReposoTech Silicone es un apósito estéril superabsorbente y desechable con capa de silicona para el tratamiento a largo plazo de piel con heridas graves y crónicas, con niveles de exudado de moderados a elevados. Se utiliza exclusivamente en adultos por parte de profesionales sanitarios en entornos hospitalarios y domésticos. El apósito puede utilizarse junto con antisépticos locales y apósitos primarios y secundarios y con compresión.

Indicaciones
ReposoTech Silicone está indicado para el tratamiento de heridas agudas o crónicas con niveles de exudado moderados a abundantes, heridas graves (heridas traumáticas, quemaduras, heridas postoperatorias) y heridas crónicas (úlceras, llagas por presión, heridas tumorales, pies diabéticos).

Modo de aplicación
- Limpie la herida con suero fisiológico o según las indicaciones del médico.
- Elija un apósito de un tamaño adecuado para la herida que cubra los bordes de esta en aprox. 1 – 2 cm. No recorte el apósito.
- Antes de aplicar el apósito, después de limpiar la herida, asegúrese que la zona en torno a la herida esté seca con gasas, para garantizar la adhesión del apósito.
- Retire las láminas protectoras. Aplique el apósito por el lado adherente sobre la herida, de forma que el lado verde quede en el lado opuesto a la herida.
- Fije el apósito con vendaje 2-Pha-Soft o cualquier otro sistema adecuado, o bien, en caso necesario, aplique vendajes compresivos según las indicaciones del médico.
- Un apósito puede dejarse en la herida hasta cinco días, en función del estado de la herida y del protocolo clínico establecido. Debe cambiarse si así está indicado por el médico o si el exudado rebasa del apósito.

Contraindicaciones
No utilice ReposoTech Silicone en caso de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

Precauciones especiales
El apósito no puede recortarse para ajustarlo al tamaño de la herida.
- Antes de tratar una herida dirtil de cicatrizar, es necesario consultar a un médico para que diagnostique las causas. Con el tratamiento con ReposoTech Silicone no puede sustituir una terapia causal de los trastornos que afectan el proceso de cicatrización de la herida. Si existen signos clínicos de infección, se debe controlar con el tratamiento adecuado antes de utilizar el apósito.
- Siga siempre el protocolo clínico establecido.
- Ante la falta de datos que respalden el uso de este apósito en grupos sensibles como bebés, niños, embarazadas o mujeres en periodo de lactancia, y ante la falta de evidencias lo contrario, el apósito se debe utilizar con precaución en estos grupos y de acuerdo con la recomendación del médico.
- No se recomienda estar de pie sobre el apósito, por ejemplo, en caso de heridas en los pies.
- En el caso de apósitos con envase despegable de doble capa de papel: ¡El sellado (banda azul) de este envase contiene látex natural susceptible de provocar reacciones alérgicas!

Es peligroso reutilizar un producto sanitario de un solo uso. Reprocesar los productos para volver a utilizarlos puede dañar seriamente su integridad y su rendimiento. Información disponible previa solicitud.

Efectos secundarios
Aumento del exudado, maceración, aumento del dolor, adherencia del apósito a la herida, prurito, escozor, edema, úlcera múltiple, avulsión cutánea, ampolla, eritema. Si se produce cualquiera de estos efectos secundarios, consulte a un médico.

Notificación de incidencias
Para pacientes/usuarios/terceros de la Unión Europea y países con idéntico marco normativo (Reglamento (UE) 2017/745), sobre los productos sanitarios): si durante el uso de este dispositivo o como resultado del mismo, se produjera un incidente grave, deberá notificarse al fabricante y/o su representante autorizado, y a la autoridad nacional correspondiente.

Eliminación del producto
A fin de reducir al mínimo el riesgo de posibles infecciones o de contaminación medioambiental, los componentes desechables de los productos sanitarios deben seguir los procedimientos de eliminación aplicables por las leyes, normas y requisitos locales pertinentes, así como por las normas de prevención de infecciones. Elimine el producto sanitario junto con los residuos domésticos.

Fecha de revisión del texto: 2020-03-11

ES — Laboratorios HARTMANN S.A. · 08302 Mataró

PT

Instruções de utilização

Descrição do produto
ReposoTech Silicone é uma compressa estéril para o tratamento de feridas agudas, crónicas e exsudativas de nível moderado a abundante. A camada de silicone em contacto com a ferida permite uma aplicação fácil e uma remoção praticamente indolor e sem trauma. O disco absorvente absorve e retém o exsudado.

Composição
ReposoTech Silicone inclui um disco absorvente feito de celulose e polialcoato superabsorvente, para absorver e assegurar o exsudado. Do lado da ferida, é coberto por uma camada de silicone para facilitar a aplicação da compressa e promover a não-aderência à ferida. A entretela da compressa é feita de material não-tecido de polipropileno verde, que é hidrófobo mas permeável ao ar, permitindo assim a troca gasosa.

Propriedades e modo de ação
A compressa ReposoTech Silicone absorve o exsudado e retém-no no disco absorvente. A interface de silicone microaderente evita que a compressa saia do sítio e facilita a aplicação da mesma. As compressas são mudadas de modo praticamente indolor e sem trauma.

Utilização prevista
ReposoTech Silicone é uma compressa superabsorvente estéril e descartável, com uma interface de silicone para o tratamento a longo prazo de pele lesionada, feridas agudas e crónicas, com níveis moderados a elevados de exsudado. Destina-se exclusivamente a ser usada por profissionais de saúde em ambientes clínicos ou de cuidados domiciliários. Pode ser combinada com antisséptico locais, pensos primários e secundários e com compressão.

Indicações
A compressa ReposoTech Silicone é adequada para o tratamento de feridas com níveis moderadosdistos de exsudado: feridas agudas (feridas traumáticas, queimaduras, feridas pós-operatórias) e feridas crónicas (úlceras, escaras de pressão, feridas tumorais, pé diabético).

Modo de utilização
- Limpe a ferida com a solução fisiológica ou seguindo as instruções do médico.
- Escolha uma compressa com o tamanho indicado para a ferida, certificando-se de que a compressa excede os bordos da ferida em cerca de 1 a 2 cm. Não corte a compressa.
- Antes de colocar a compressa e depois de limpar a ferida, use cotonetes para confirmar que a área em torno da ferida está seca, garantindo assim a aderência da compressa.
- Retire as películas protetoras. Coloque a compressa com o lado aderente sobre a ferida, de forma a que o lado verde não fique virado para a ferida.
- Prenda a compressa usando um penso Peha-haft ou qualquer outro modo de fixação adequado ou, se necessário, aplique ligaduras de compressão conforme as instruções do médico.
- A compressa pode permanecer na ferida até 5 dias, dependendo do estado da ferida e do protocolo clínico estabelecido. A compressa deve ser mudada se o médico assim o indicar, ou se o exsudado atingir o rebordo da compressa.

Contraindicações
Não utilize ReposoTech Silicone em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos seus componentes.

Precauções espec

постановлением и стандартами профилактики инфекций. Утилизируйте медицинские изделия согласно с действующим законом.

Последняя редакция текста: 2020-03-11

RU — PAUL HARTMANN OOO · 115114 Москва

BG

Инструкции за употреба

Описание на продукта
ResposOrb Silicone е стерилен компрес за лечение на умерено до силно секретиращи рани и кухини. Компресът е изработен от мека, адаптивна силиконова мрежа с контактна повърхност с почти безболезнено, атравматично отстраняване. Абсорбиращата подложка е изработена от въздушна вата.

Състав
ResposOrb Silicone съдържа абсорбираща подложка, изработена от целулоза и суперабсорбиращ полимер,мрежест, който абсорбира и задържа секрета. От страната на раната е покрит със силиконов слой с цел улесняване на поставянето на компреса и подсигуряване на неприлепването му към раната. Въпшната страна на компреса е водоплътна от едната страна и от полипропиленов нетъкан текстил, който е хидрофобен, но пропуска въздух и позволява обмен на газове.

Свойства и начин на действие
ResposOrb Silicone обединява мрежата и го задържа в абсорбиращата подложка. Микродренажният силиконов контактен слой предотвратява изместването на компреса в условията на постоянно движение му. Силната на компреса се изтиска атравматично и почти безболезнено.

Предназначение
ResposOrb Silicone е стерилен суперабсорбиращ компрес за ядрокарпна упротреба със силиконов контактен слой за дългосрочно лечение на умерено силна, остра и хронични рани, отделящи ексудат с умерени до високи нива. Използва се само при възможност за медицинско специалисти в клиничен или домашни условия и може да се комбинира с локални антисептични, пчелини и вторични превръзки в компресионни бинтове.

Показания
ResposOrb Silicone е подходящ за лечение на рани, отделящи ексудат с умерени до високи нива: при декубитални язви, при диабетни язви, следоперативни рани) и хронични рани (язви, язви при натиск, тумори, рани, дадбетна стъпало).

Начин на приложение
- Почистете раната с физиологичен разтвор или както ве инструктирал лекарят.
- Изберете компрес с подходящ за раната размер и се уверете, че компресът припокрива раната с поне 2 cm. Не нарязвайте компреса.
- За да се гарантира, че компресът да залепне, преди да го поставите и след поставянето му, се уверете, че кожата около раната е суха, сухо, без кал, използвате тампон.
- Отстранете защитната частица. Поставете компреса с адхезивната страна върху раната, така че зеленита страна да е външна по отношение на раната.
- Уверете компреса, изглажда, че няма гънки, които могат да доведат до подсушаване, дразнене, или рискове от инфекция, в зависимост от вида на раната.
- Ако е необходимо, с компресивни бинтове, както ве инструктирал лекарят.
- Един компрес може да остане върху раната до 5 дни, в зависимост от секрецията на раната. Ако има изключение признаци на инфекция, то трябва да бъде сменен, ако е клинично показано или когато ексудатът достигне до края на компреса.

Противопоказания
Не използвайте ResposOrb Silicone при свръхчувствителност към някой от неговите компоненти.

Специални предпазни мерки
- Този компрес е нестерилен. Да бъде нарязван по размер.
- Преди почистване на рана с наличието запасване трябва да се направи консултация с лекар, който да постави клинична диагноза. Почистете със ResposOrb Silicone не зависимо основното лечение на причината, довела до образуването на раната. Ако възникнат признаци на инфекция, то трябва да бъде контролирана с подходящо лечение преди използването на този компрес.
- Във всички случаи следвайте установения клиничен протокол.
- При липса на клинични данни относно устойчивостта на този компрес при чувствителни групи от населението, като например бебета, деца, бременни или кърмещи жени, е при необходимо да се прецени, че ползата от това групи от населението това компресът трябва да се използва с повишено внимание и по медицинска преценка.
- Не се препоръчва да се стъпва върху компреса, напр. в случай на рани по стъпалото.
- За компреса, който са основано в стерилни опаковки изцяло от картон: Използвайте запечатаният чип само ако опаковка съдържа всички части, които може да предизвика алергичен реакция!

Повторната употреба на медицинско изделие за еднократна употреба е опасна. Повторна обработка на медицинско изделие с цел предотвратяване на инфекция, са трябва да бъде спазвано, а с клинично показано или когато ексудатът достигне до края на компреса.

Съхранение
Съхранявайте на сухо и защитено от слънчева светлина място при стайна температура.

Съобщаване на инцидентите
За пациентите/потребителите страна в Европейския съюз и в страни с идентичен регулаторен режим (Регламент 2017/745/ЕО за медицинските изделия): ако по време на използването на това изделие или в резултат на неговото използване настъпи сериозен инцидент, моля, докладвайте го на производителя и/или упълномощения му представител и на вашия национален орган.

Изхвърляне на продукта
Поради да се намали рискът от възможна опасност от инфекция или замърсяване на околната среда използваните на медицинското изделие трябва да бъдат третирани съгласно за изхвърляне на медицинските вещи, правила, разпоредби и стандарти за предаването от инфекциозни. Изхвърлянето медицинските изделия трябва да.

Дата на актуализиране на текста: 2020-03-11

BG — ТП ХАРТМАНН-РУКО · 1113 София

HR

Upute za uporabu

Opis proizvoda
ResposOrb Silicone sterilni je zavoj namijenjen za liječenje akutnih i kroničnih rana s umjerenom do jakom eksudacijom. Silikonski sloj u obliku mrežice omogućuje jednostavno skidanje bez oštećenja tkiva. Upijajući sloj izrađen je od celuloze i superapsorbirajućeg polimera. Upijajući jastučić ugrađen je u zaštitnu mrežicu.

Sastav
ResposOrb Silicone sadrži upijajući jastučić napravljen od celuloze i superupijajućeg polakrilata rađi upijanja i zadržavanja eksudata. Na strani okrenutoj prema rani prekriven je silikonskim slojem koji olakšava stavljanje zavoja i pomaže pri ograničavanju ljepljenja za ranu. Poleđina zavoja napravljena je od zelenog polipropilenskog netkanog materijala koji je hidrofoban, ali propušta zrak i omogućuje izmjenu plinova.

Svojstva i način djelovanja
ResposOrb Silicone upija eksudat i zadržava ga u upijajućem jastučiću. Mikroadhezivni silikonski površinski sloj sprječava smicanje zavoja i olakšava njegovo postavljanje. Promjene zavoja izvode se bez oštećenja tkiva i gotovo bezbolno.

- Inainte de tratarea unei plăgi care prezintă un rim de vindecare deficitar, trebuie consultat un medic clinician în vederea stabilirii unui diagnostic. Curățarea constituie cu ResposOrb Silicone nu poate înlocui tratamentul cauzei vindecării precare a plăgii. Dacă există simptome de infecție, acestea trebuie controlate și cu un tratament adecvat înainte de utilizarea acestui pansament.
- Indiferent de situație, trebuie să respectați protocolul clinic existent.
- Dată fiind lipsa datelor care să susțină sau care să contrandrime utilizarea acestui pansament la grupuri sensibile de populație, cum ar fi sugari, copii, femeile însărcinate sau care care alăptează, pansamentul trebuie utilizat cu precauție, pe baza recomandării unui medic clinician.
- Nu este recomandată spălrinirea pe pansament, de ex. în cazul plăgilor de pe picioare.
- În cazul pansamentelor la pachet, sterile:Nu folosiți sterile dacă ambalajul conține bare din caucioc natural, poate cauza reacții alergice!

Reutilizarea unui dispozitiv medical de unică folosință este percisoasă. Reprocesarea dispozitivelor. În scopul reducerii riscului de infecție sau poluare a mediului înconjurător, dispozitivele medicale trebuie eliminate în conformitate cu legislația, regulile și standardele aplicabile privind eliminarea deșeurilor infecțioase.

Depozitare
Depozitați pansamentul într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui, la temperatura camerei.

Raportarea incidentelor
Pentru un pacient/utilizatorul/o parte din Uniunea Europeană și din țări cu un regim de reglementare echivalent (Regulamentul (UE) 2017/745/UE privind dispozitivele medicale): dacă, pe durata utilizării acestui dispozitiv sau ca urmare a utilizării sale ar fost un incident grav, vă rugăm să îl raportați producătorului sau/sau reprezentantului autorizat al acestuia, precum și autorității dvs. naționale.

Eliminarea produsului
Pentru a minimiza riscul eventualelor pericole de infecție sau al poluării mediului, componentele dispozitivului medical care au fost în contact cu sângele trebuie să fie supuse procedurilor de eliminare conform legilor, regulamentelor și reglementărilor locale aplicabile și standardelor de prevenire a infecțiilor. Dispozitivul medical se va elimina împreună cu deșeurile menajere.

Data revizuirii textului: 2020-03-11

RO — S.C. PAUL HARTMANN S.R.L. · 020194 Bucureşti

SI

Navodila za uporabo

Opis izdelka
ResposOrb Silicone je sterilna oblога za zdravljenje kroničnih in akutnih ran z zmernim do močnim izcedkom. Silikonska plast, ki je v obliki z rano, omogoča enostavno odstranjevanje in ščiti pred poškodbo, atravmatsko odstranjevanje obloge. Vpojna blazinica vpije in zadrži eksudat.

Sestava
Oblога ResposOrb Silicone vsebuje vpojno blazinico iz celuloze in super vpojnega polakrilata. Silikonska plast na strani, ki je obrnjena proti rani, je perforirana proti, in omogoča prehajanje eksudata v blazinico. Zunanja stran obloge je izdelana iz zelene plasti netkanega polipropilena, ki je odporna proti vodi, vendar prepustna za zrak in dopušča izmenjavo plinov.

Lastnosti in delovanje
ResposOrb Silicone vpije eksudat in ga zadrži v vpojni blazinici. Mikroplenja, silikonska višina plast preprečuje pomeni premik obloge in olajša njeno namestitev. Menjave obloge poteka atravmatično in skoraj brez bolečin.

Namen uporabe
ResposOrb Silicone je sterilna super vpojna oblога za enkratno uporabo s silikonsko mrežico za zdravljenje zmerno do močno izločajočih ran. Uporablja se samo na zdravniški recept v klinični ali domači oskrbi in se lahko kombinira z lokalnimi antiseptiki, pčelnimi ali sekundarnimi oblogami ter pod kompresijskimi povoji.

Indikacije
Oblога ResposOrb Silicone je primerna za zdravljenje ran z zmernim do močnim izločanjem: akutnih in kroničnih ran (npr. dekubitalnih razjed, diabetičnih razjed, kirurških ran, razjede zaradi pritiska, maligne kožne rane, diabetično stopalo).

Način uporabe
- Rano očistite s fiziološko raztopino ali po navodilih klinčnega zdravnika.
- Izberite ustrezno velikost obloge za rano in se prepričajte, da obloga sega čez robove rane za približno 1–2 cm. Obloge ne obrezujte.
- Preden namestite obloge, po tem, ko ste odprli rano, z zlolenci prevenite, ali je koža dejlo rana suha, da zaprotnite, da se bo obloga prilepila.
- Odstranite zaščitne plasti. Lepilno stran obloge namestite na rano tako, da je zelena plast obrnjena stran od rane.
- Oblogo zavarujte npr. s povojem Peha-haft ali kateriim koli drugim ustreznim pripomočkom za pritrjevanje. Pazite, da povoj ne bo pretesno, saj lahko povzroči zaviranje obtočnega izhodnega.
- Oblogo lahko na rani pustite do 5 dni, odvisno od stanja rane in uvajčevanja klinčnega protokola. Oblogo je treba zamenjati, če se pojavijo klinične indikacije ali če eksudat doseže rob obloge.

Kontraindikacije
Oblogo ResposOrb Silicone ne uporabljajte v primeru preobčutljivosti na katero koli sestavino obloge.

Posebni previdenostni ukrepi
Obloga za rano ne smete sterilizirati.
- Pred začetkom zdravljenja rane z ostalejšimi sposobnostjo celjenja se morate posvetovati s klinčnim zdravnikom, da postavi klinično diagnozo. Čiščenje z oblogo ResposOrb Silicone ne more nadomestiti zdravljenja vzroka za počasnejše celjenje rane. Če so prisotni klinični znaki okužbe, morate okužbo obvladati z ustreznim zdravljenjem, preden lahko uporabite to oblogo.
- V vseh primerih upoštevajte ustaljeni klinični protokol.
- Če imate podatkov glede uporabe te obloge pri občutljivih skupinah prebivalstva, kot so dojenčki, otroci in noseče ali doječe ženske, ne morate podatkov pred kontraindikacij pri teh skupinah predvidevalna, morate to obloga uporabljati previdno in v skladu s priporočili klinčnega zdravnika.
- Na oblogi ni priporočljivo stati, npr. če to rane prsteno na stopalu.
- Za oblogo, ki so pakirani v papirni materiali, sterilni embalaži: zapečatani čip uvotnaj, sterilne embalaže vsebuje naravni lateks, ki lahko povzroči alergijske reakcije!

Ponovna uporaba medicinskega izdelka za enkratno uporabo je nevarna. Predvideva pripomočkov z nanemom, da bi ih ponovno uporabili, lahko resno ogrozi njihovo celovitost in učinkovitost. Informacije so na voljo za zahtevo.

Stranski učinki
Povečan eksudat, maceracija, povečana bolečina, spremljevanje obloge z rano, srbečica, pekoč občutek, edem, vekturna atonazija, rdečina kože, mehurji, eritem. Če se pojavi katen koli od teh stranskih učinkov, se posvetuje z klinčnim zdravnikom.

Shranjevanje
Za shranjevanje nevarnosti nastanka okužb ali onesnaževanja okolja morate pri ohranjevanju okolja medicinskega pripomočka upoštevati postopke odstranjevanja v skladu z veljavnimi in lokalnimi zakoni, pravili, predpisi in standardi preprečevanja okužb. Medicinski pripomočki odstranite med gospodinjske odpadke.

Datum zadnje revizije besedila: 2020-03-11

SI — PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o. · 1000 Ljubljana

SE

Bruksanvisning

Produktbeskrivning
ResposOrb Silicone är ett sterilt förband för behandling av akuta och kroniska sår med måttlig till stor exsudatproduktion. Silikonskiktet i kontakt med såret möjliggör enkel applicering och nästan smärtfri, atraumatisk borttagning. Den absorberande delen absorberar och håller kvar exsudatet.

Sammansättning
ResposOrb Silicone innehåller en absorberande dyna av cellulosa och superabsorberande polyakrylat, för absorption och retention av exsudat. På såridan är det täckt med ett silikonskikt som förhindrar applicering av förbandet och minimerar vidhäftning mot såret. Förbandets baksida består av grönfärgad nonwoven polypropylen. Den är hydrofob men genomtränglig för luft och tillåter gasutbyte.

Egenskaper och verkan
ResposOrb Silicone absorberar och håller kvar exsudatet i den absorberande dynan. Den mikrovävnadslika kontaktytan i silikon hindrar förbandet från att glida och gör det lätt att applicera. Förbandsbytena är atraumatiska och nästan smärtfria.

Avsedd användning
ResposOrb Silicone är ett superabsorberande och sterilt engångsförband med silikonyta för behandling av måttligt till kraftigt exsuderande akuta och kroniska sår, till exempel trycksår, diabetessår, kirurgiska sår, bensår och diabetesfot.

Användningsinformation
- Rengör såret med fysiologisk lösning eller enligt läkares anvisning.
- Välj en lämplig storlek på förbandet så att förbandet går åt 1–2 cm utanför sårkanterna. Klipp inte till förbandet.
- När såret har rengjorts och innan förbandet appliceras ska ytan runt såret göras fullständigt torr med hjälp av bomull eller gas för att förbandet fäster ordentligt.
- Ta bort skyddsfilmen. Lägg förbandet med fästytan mot såret, så att den gröna sidan pekar utåt från såret.
- Fäst förbandet med exempelvis Peha-haft eller annan lämplig fixering, eller vid behov med kompressionsförband eller elastiskt bandage.
- Förbandet kan sitta kvar i upp till 5 dagar beroende på sårets skick och efterlevnad klinisk protokoll. Förbandet måste bytas ut om det är nödvändigt eller om exsudatet når ut till kanten på förbandet.

Kontraindikationer
Använd inte ResposOrb Silicone om patienten är överkänslig mot någon av beståndsdelarna.

Särskilda försiktighetsåtgärder
Förbandet får inte sträckas eller klippas.
- Innan en sårbehandlingen behandlas måste en läkare konsulteras så att en diagnos kan ställas. Rengöring med ResposOrb Silicone kan inte ersätta behandling av orsakerna som ligger bakom sårläkningsstörningen. Om det finns kliniska tecken på infektion ska infektionen tas om hand med hjälp av lämplig behandling innan detta förband kan användas.
- Följ alltid etablerat klinisk protokoll.
- I avsaknad av tillgängliga data som stöder användningen av detta förband på känsliga populationer, såsom spädbarn, barn samt gravida och ammande kvinnor, och i avsaknad av data om motsatsen, ska förbandet användas med försiktighet och på läkares rekommendation på dessa populationsgrupper.
- Du rekommenderas att inte stå på förbandet, t.ex. vid sår på fotterna.
- Förband som är förpackade i sterila kartongförpackningar: Använd endast förpackningens försegling om innehållet naturlig gummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner!

Det är farligt att återanvända en medicinteknisk produkt för engångsbruk. Vid behandling av produkter för återanvändning kan integriteten och prestandan allvarligt skadas. Information kan fås på begäran.

Bioerkningar
Oktat exsudat, maceration, skärsår, smärta, vidhäftning av förbandet mot såret, klåda, blåsmande klåda, ödem, blåsor, rodnad, hudrodnad, blåsbildning, blåsor, rodnad. Rådfråga läkare om någon av dessa biverkningar skulle uppstå.

Incidentrapporter
Patienter, användare och tredje part i EU och länder med identiska regulatoriska krav (förordning 2017/745/EU för medicintekniska utrustning) ska rapportera allvarliga incidenter i samband med att produkten används till tillverkaren och/eller en behörig representant samt till den ansvariga myndigheten i landet.

Bortskaffande av produkten
För att minska risken för möjlig infektionsöverföring eller miljöförstöring ska de kasserbara delarna av den medicintekniska produkten bortskaffas i enlighet med de förlaranden för bortskaffande som anges i lokala bestämmelser och standarder för infektionsförebyggande. Bortskaffa den medicintekniska produkten tillsammans med hushållsavfall.

Kontaktinformation
Oblogo ResposOrb Silicone ne uporabljajte v primeru preobčutljivosti na katero koli sestavino obloge.

SE — HARTMANN-ScandiCare AB · 33421 Anderstorp

DK

Brugsanvisning

Produktbeskrivelse
ResposOrb Silicone er steril forbinding til behandling af akutte og kroniske sår med moderat til stor mængde sekundær sekretion. Silikonelaget i kontakt med såret sørger for let og næsten smertefri påføring og atraumatisk fjernelse. Den absorberende del absorberer og holder på eksudatet.

Sammensætning
ResposOrb Silicone består af et absorberende lag af cellulose og superabsorberende polyacrylat til absorption og fastholdelse af eksudat. På sårsiden er den dækket af et silikonelag, der gør det nemmere at anlægge forbindingen og hindrer vedhæftning til såret. Forbindingens bagside er lavet af grøn, non-woven polypropylen, der er hydrofob, men luftgennemtrængelig, så luftarteren kan passere.

Egenskaber og virkemåde
ResposOrb Silicone absorberer eksudat og holder det i det absorberende lag. Grænsefladen i silicone med mikroovdhærtning forhinder forbindingen i at glide og gør den nem at anlægge. Forbindingsskiftet er atraumatisk og næsten smertefrit.

Tilsigtet anvendelse
ResposOrb Silicone er en steril, aktiv kirurgisk absorberende forbindingi til engangsbrug med en silicone gennemsøgelse til langtidsbehandling af akutte og kronske sår med moderat til høj eksudat. Produktet kan anvendes til behandlingsophenomener i klinikker miljøer eller hjemmesygeplejemiljøer på voksne og kan kombineres med lokalt anvendte antiseptiske midler, primære og sekundære forbindinger og under kompression.

Indikationer
ResposOrb Silicone egner sig til behandling af akutte sår med moderate til store mængder eksudat (traumatiske sår, forbrændinger, postoperative sår) og kronske sår (ulcus, tryksår, tumorsår, diabetiske fodsår).

Anvendelsesmetode
- Rens såret med en fysiologisk opløsning, eller efter lægens anvisninger.
- Forbindingen vælges i en passende størrelse, så forbindingen overlapper sårkanten med en til to centimeter. Forbindingen må ikke klippes til.

Tilpas forbindingen til sårets størrelse, og sørg for, at den ikke er beskadiget. Hvis forbindingen skal klippes til, skal det gøres, inden den påføres på såret.
- Fjern beskyttelsesvoksen. Sørg for, at forbindingen er placeret korrekt på såret, så den grønne side vender udad fra såret.
- Fæst forbindingen med fx Peha-haft eller en anden tilpasset fastgørelse, eller ved behov med kompressionsbandage.
- Forbindingen kan sidde i op til 5 dage afhængigt af sårets tilstand og den etablerede klinske protokol. Forbindingen skal skiftes, når der er klinisk indikation derfor, eller når eksudatet når kanten af forbindingen.

Kontraindikationer
Brug ikke ResposOrb Silicone ved overfølsomhed over for et eller flere af forbindingens komponenter.

Særlige forholdsregler
Sårforbindingen må ikke klippes til i størrelsen.
- Før behandling af et sår skal patienten undersøges af en klinker konsulteres for at få en klinisk diagnose. Behandlingen med ResposOrb Silicone kan ikke erstatte en behandling af årsagen til sårheling. Hvis der er kliniske tegn på infektion, skal infektionen behandles med hensigtsmæssig behandling, før denne forbindingen anvendes i brug.
- Den etablerede kliniske protokol skal følges under alle omstændigheder.
- Hvis der ikke findes data til støtte for anvendelsen af denne forbinding til følgende grupper som spædbørn, børn, gravide eller ammende kvinder, og hvis der ikke findes data om det modsatte, anbefales det, at forbindingen anvendes efter klinikkernes anbefalinger.
- Det anbefales at ikke stå på forbindingen, og udsættes forbindingen for fuld kropsvægt, f.eks. ved sår på fødderne.
- For forbindinger, der er pakket i sterile papirindpakninger af papir: Den forseglede sterile pose må kun åbnes af personale med passende træning!

Genbrug af medicinsk engangsudstyr er forbundet med fare. Rengøring og sterilisering af udstyret med henblik på genbrug kan kompromittere integritet og forringe dets ydeevne alvorligt. Oplysninger kan rekvireres efter anmodning.

Biverkninger
Øget eksudat, maceration, flere smerter, vedhæftning til såret, klø, blærer, brændende fornemmelse, ødem, flere maceration; forneset hud, blærer, erytem. Søg læge, hvis nogen af disse biverkninger opstår.

Rapportering af hændelser
For patient/brugere/tredjeparter i den Europæiske Union og i lande med identisk regulering (EU-forordning nr. 2017/745/EU om medicinsk udstyr): Hvis der under brug af denne enhed eller som et resultat af denne anvendelse har fundet en alvorlig hændelse sted, bedes du rapportere den til producenten og/eller dennes autoriserede repræsentant og til den nationale myndighed.

Bortskaffelse af produkt
For at minimere risikoen for mulig infektionsfarer eller forurening af miljøet bør bortskaffelsen af engangsprodukter i medicinsk udstyr følge bestemmelserne i gældende regler, love, bestemmelser og standarder for forebyggelse af infektionsspredning. Bortskaf det medicinske udstyr sammen med det almindelige husholdningsaffald.

Dato for revision af teksten: 2020-03-11

DK — PAUL HARTMANN A/S · 2300 København

FI

Käyttöohjeet

Tuotteen kuvaus
ResposOrb Silicone on kohtuullisesti tai runsaasti erittävien akuuttien ja kroonisten haavojen hoitoon tarkoitettu steriili side. Haavapuolen silikonikerros mahdollistaa helpon asettamisen ja lähes kivuttoman, atraumaattisen irrottamisen. Imukykyinen tyyny imee tukkeutuneisteen ja pitää sen sisällään.

Koostumus
ResposOrb Silicone -sitessä on selluloosasta ja erittäin tehokkaasta imukykyisestä polyakrylaatista valmistettu imukerros, joka sitoo ja pitää eritteet sisällään. Haavakohtaisella sitessä on silikonikerros, joka helpottaa siteen asettamista ja ehkäisee sen tarttumista haavaan. Sitteen ulkopuoli on valmistettu vihreästä polypropeenikuitukankaasta, joka hylkii vettä, mutta päästää läpi ilmaa ja mahdollistaa kaasujen vaihdon.

Ominaisuudet ja toimintatapa
ResposOrb Silicone imee itseensä erittetä ja pitää ne imutyynyn sisällä. Mikrolimautuva silikonipinta estää siteen siirtymisen ja helpottaa sen asettamista. Side voidaan vaihtaa atraumaattisesti ja lähes kivuttomasti.

Käyttötarkoitus
ResposOrb Silicone on kertakäyttöinen, sterilli, erittäin tehokas imukykyinen, silikonihaavasidos pitkäaikaiseen hoitoon kohtalaisesti tai runsaasti eritteleville akuuteille ja kroonisille haavoille, jossa havaitsetella erittyy haitallisen määrän kosteutta. Sidosta saa käyttää ainoastaan lääkärin määräyksestä tai hänen ohjeidensa mukaisesti kotihoidossa tai sitä voidaan käyttää ohkeisä paikallisen antiseptisen aineiden sekä erisisäisten ja toissijaisten sidosten kanssa sekä painesiteiden alla.

Käyttöohjeet
ResposOrb Silicone soveltuu kotilaisesti tai ammattimaisesti erittävien akuuttien (traumaperäisten haavat, palovammat, leikkushaavat) ja kroonisten haavojen, kuten makuuhaavat, kasvainhaavat, diabeteksesta aiheutuvat jalkahaavat) haavojen hoitoon.

Sidosten asettaminen
- Puhdista haava fysiologisella liuoksella lääkärin ohjeiden mukaan.
- Valitse haavalle sopiva sidoksen koko, että side ulottuu noin 1–2 cm haavan reunojen yli. Säädä sitä saksilla.
- Varmista haavan huolellinen jälkeen, ennen siteen asettamista, että haavaa ympäröivä iho on kuiva. Varmista, että side tarttuu kunnolla ympäröivään ihoon tarvittaessa pumpulipuikolla.
- Poista suojakalvot. Aseta side limapuoli alaspäin haavan päälle niin, että vihreä puoli osoittaa ylöspäin.
- Kiinnitä side esimerkiksi Peha-haft-sidoksen tai muun soveltuvan sidoksen avulla tai käytä kääntön niin määräessä kompressiosidetta.
- Sidetä voidaan jättää haavan päälle enintään viideksi päiväksi haavan tilan ja laitoksen vaiko-ohjeistuksen mukaan. Side on vaihdettava, jos siihen on kliinisen indikaation tai kun eritteet tunkeutuvat siteen reunan yli.

Vasta-aiheet
Älä käytä ResposOrb Silicone -sidetä, jos potilas on yliherkkä jollekin sen osalle.

Erityiset varotoimet
Sidettä ei saa leikata.
- Ennen hoitoa ja paranevan haavan hoidon aloittamista on kyseyttävä neuvoa lääkäriltä, jotta muodostaa kliinisen diagnoosin. Hoito ResposOrb Silicone -sitellä ei korvaa haavan hoidon aiheuttavan hoitoa. Mikäli tulehduksen kliinisiä merkkejä infektiosta, infektio on saatava hallinnan sopivalla hoidolla ennen tämän siteen käyttöä.
- Noudata kaikissa tapauksissa laitoksen vakio-ohjeista.
- Koska tämän siteen käytöstä herkille potilasryhmille, kuten pikkulapsille, lapsille, raskaana olevile tai imettäville naisille, ei ole tietoja puolesta eikä vastaan, sidettä tulee käyttää näille ryhmille lääkärin suosituksesta ja erityisessä varovaisuudella.
- Suositellaan, etta siteen päällä ei seistä, jos haava on esimerkiksi jalkapohjassa.
- Steet, jotka on pakattu suojapaperisiin sterileihin pakkauksiin: kalvopakkauksen sinetistä saama sisältää luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita!

Kertakäyttöisen lääkinnällisen laitteen uudelleenkäyttö on vaarallista. Laitteiden käsittely uudelleenkäyttöä varten voi vahingoittaa niiden eheyttä ja toimivuutta huomattavasti. Lisätietoja on saatavilla pyynnöstä.

Haittavaikutukset
Lisääntynyt eritys, maseraatio, lisääntynyt kipu, siteen kiinnittyminen haavaan, kutina, punitsaa tunne, edeema, uusita haavaumia, ihon ympeytymien, ihon punoitus, jos jokin näistä haittavaikutuksista ilmenee, kysy neuvoa lääkäriltä.

Tapahtumista ilmoittaminen
Potilas, käyttäjä/kolmas osapuoli Euroopan unionissa ja maissa, joiden hallintotapa on samanlainen (asetus 2017/745/EU lääkinnällisistä laitteista): jos tämän laitteen käytön aikana tai seurauksena ilmenee vakava haittatapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle jaitsi sen valtuutetulle edustajalle ja toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle.

Tuotteen hävittäminen
Jotta mahdollisten infektovaaranjen tai ympäristön saastumisen riskit voidaan minimoida, lääkinnällisten laitteen hävittämisen osien osalta on noudatettava soveltuvien lakien, säädösten ja infektioiden ehkäisystandardien mukaisia hävittämisohjeita. Hävitä lääkinnällinen laite talousjätteenä.

Tekstin muuttamispäivämäärä: 2020-03-11

NO

Bruksanvisning

Produktbeskrivelse
ResposOrb Silicone er en steril sugekompress til behandling av akutte og kronske sår med en avlyr moderat til mye sårvæske. Silikonlaget som er i kontakt med såret, gjør at det er lett å sette sugekompressen på, og atraumatisk og nesten smertefritt å fjerne den. Sugekompressen absorberer og holder tilbake sårvæsken.

Sammensetning
ResposOrb Silicone inneholder en absorberende puste laget av cellulose og superabsorbert polyakrylat som skal absorbere og holde tilbake sårvæske. På siden som vender mot såret er den dekket med et silikonlag, som gjør det lettere å sette sugekompressen på, og som bidrar til at den ikke setter seg fast i såret. Sugekompressens bakside er laget av grønt, hydrofobt, men luftgjennomtrengelig polypropylen-vev. Materialet er hydrofobt, men slipper gjennom luft, og dermed kan gass utvekles.

Egenskaper og virkemåte
Sugekompressen leger seg til bendning av sår og holder den tilbake i den absorberende puten. Den mikro-hefrende kontaktflaten i silikon hindrer at sugekompressen skiir av at utlbyter med bevegelse. Skifte av forbindingen er smertefritt og nesten uten smerter.

Tilsiktet bruk
Steril sugekompress av polyakrylat for behandling av sår med middels til stor sårvæskeproduksjon. Produktet kan brukes i sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien hos voksne pasienter og kombineres med lokalt virkende antiseptika, primære og sekundære bandasjer og kompresjonsbandasjer.

Indikasjoner
ResposOrb Silicone egner seg til behandling av sår med moderate til høye nivåer av sårvæske, akutte sår (traumatiske sår, brannsår, postoperative sår) og kronske sår (leggsår, trykksår, svulstsår, diabetisk fotsår).

Bruksrevisjoning
- Rengjør såret med fysiologisk saltløsning eller i samsvar med instruksjonene fra lege.
- Velg egnet sugekompressstørrelse for såret, og sørg for at sugekompressen overlapper sårets kanter med minst 1–2 cm. Du må ikke klippe til sugekompressen.
- Før du setter sugekompressen på, etter at såret er skylet, må du pase at området rundt såret er tørt ved bruk av vattpinner, for å sikre at sugekompressen sitter fast.
- Fjern beskyttelsesvoksstrekene. Sett sugekompressen på med klebesiden vendt mot såret, og slik at grønnsiden vender utover fra såret.
- Fest sugekompressen sikkert ved hjelp av f.eks. en Peha-haft-bandasje eller annet egnet festemiddel, eller, hvis nødvendig, bandasje og kompresjonsbandasje med instruksene fra legen.
- En sugekompress kan holdes på såret i opptil 5 dager, avhengig av sårets tilstand og fastsatt klinisk protokoll. Sugekompressen må byttes hvis det er klinisk indisert, eller når sårvæsken når frem til kanten av sugekompressen.

Kontraindikasjoner
Sugekompressen må ikke brukes hvis pasienten er overfølsom overfor noen av komponentene.

Spesielle forholdsregler
Sugekompressen på såret skal ikke klippes for å passe til sårstørrelsen.
- Før behandling av et sår må pasienten undersøkes av lege, slik at det kan stilles en klinisk diagnose. Behandlingen med ResposOrb Silicone kan ikke erstatte en kausalbehandling av problemet som hindrer helbredelse av såret. Hvis det er kliniske tegn på infeksjon, må infeksjonen kontrolleres med egnet behandling før denne sugekompressen tas i bruk.
- Du må alltid følge den fastsatte kliniske protokollen.
- Ved fravær av tilgjengelige data som støtter bruken av denne sugekompressen på følsomme populasjoner, for eksempel spedbarn, gravide eller ammende kvinner, og ved fravær av motsatte data, anbefales det at sugekompressen brukes på disse populasjonene med forsiktighet og etter anvisning av lege.
- Det anbefales at en ikke står på sugekompressen, spesielt ikke ved sår på fotsålene.
- For sugekompresser som er pakket i resepakninger med papir mot papir: Den forseglede sterilpose må kun åpnes av personale med tilstrekkelig opplæring!

Gjenbruk av medisinsk engangsutstyr er farlig. Reprosessering av utstyr for å bruke det på nytt kan skade utstyrets integritet og øyke på drastisk vis. Informasjon tilgjengelig på forespørsel.

Bivirkninger
Økt sårvæske, maserasjon, økte smerter, festing av sugekompressen til såret, kløe, svie, ødem, dannelse av flere sår, rifter i huden, blemmer, erytem. Hvis noen av disse bivirkningene forekommer, må du rådføre deg med lege.

Melding av hendelser
For en pasient/bruker/tredjepart i Den europeiske union og i land med identisk lovgivning (forordning 2017/745/EU om medisinsk utstyr): Hvis det har skjedd en alvorlig hendelse under bruk av denne enheten, eller som et resultat av bruken, må du melde fra til produsenten og/eller den autoriserte representanten, og til kompetent myndighet.

Kassering av produktet
For å redusere risikoen for mulig smittefare eller miljøforurensing bør engangsprodukter i medisinske enheter kastes etter prosedyrer, i henhold til lokale lover, regler, bestemmelser og standarder for infeksjonsforebygging. Det medisinske utstyret skal kastes sammen med husholdningsavfall.

Oppdateringsdato: 2020-03-11

NO — PAUL HARTMANN AS · 0278 Oslo

EE

Kasutusjuhend

Toote kirjeldus
ResposOrb Silicone on steriilne sidemematerjal mõõdukalt kuni suures koguses eksudeeruvate ägedate ja kroonilise haavade raviks. Silikoonkiht, mis on kontaktis haavaga, võimaldab sidet hõlpsasti peale panna ja seda valutult ja atraumaatiliselt eemaldada. Imav kiht imendab ja hoiab eksudaati kinni.

Koostis
ResposOrb Silicone sisaldab imavat kihti, mis koosneb tselluloosist ja superabsorbeerivast polümeerist. Haavapoolsel küljel on silikoonkiht, mis hõlbustab sidemete asetamist ja eemaldamist ning takistab imava kihi kinnikasvamist haavaga. Sidemete tagakülg on valmistatud rohelisest polüpropüleenkiust mittekootud kangast, mis on hüdrofoobne, kuid õhku läbilaskev.

Omadused ja toimimine
Imav kiht imendab haavaeritise ja hoiab selle kinni. Mikrokleepuv silikoonkiht takistab sidemete nihkumist ja hõlbustab nende paigaldamist. Sidemeid saab vahetada atraumaatiliselt ja peaaegu valutult.

Kasutusotstarve
ResposOrb Silicone on ühekordne, steriilne, väga imav silikoonhaavside, mis on ette nähtud mõõdukalt kuni suures koguses eksudeeruvate ägedate ja kroonilise haavade, nagu näiteks lamatushaavade, diabeetilise jalahaavade ravi. Seda tohib kasutada ainult arsti käsul või juhendamisel kodus või ambulatoorses keskkonnas koos antiseptiliste ainetega ning esmaste ja teiseste sidemete ja survesidemete all.

Kasutusjuhised
- Puhastage haav füsioloogilise lahusega või arsti juhiste kohaselt.
- Valige haavale sobiv suurus ja veenduge, et side ulatub haavaservadest vähemalt 1–2 cm võrra kaugemale. Ärge lõigake sidet.
- Pärast haava puhastamist ja enne sidemete asetamist veenduge, et haavaümbrus oleks kuiv. Kuivatage vajadusel vatipulgaga, et side kleepuks hästi.
- Eemaldage kaitsekile. Asetage side haavale nii, et roheline külg jääks haavast väljapoole.
- Kinnitage side näiteks Peha-haft sidemega või muu sobiva kinnitusvahendiga ja vajadusel survesidemega.
- Sidet võib haavale jätta kuni 5 päevaks, olenevalt haava seisundist ja kehtestatud kliinilisest protokollist. Side tuleb vahetada, kui see on kliiniliselt näidustatud või kui eksudaat jõuab sidemest üle.

Vastunäidustused
Ärge kasutage ResposOrb Silicone'i, kui patsiendil on ükskõik millise koostisosa suhtes ülitundlikkus.

Erilised ettevaatusabinõud
Sidet ei tohi steriliseerida ega lõigata.
- Enne haavade ravimist peab patsient läbima arstliku läbivaatuse, et sa