DE

Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung
Repsodin Silicone Border ist eine sterile, selbsthaftende, superabsorbierende Saugkompresse mit Silikonwundkontaktschicht für die Behandlung von mittelstark bis stark exsudierenden, chronischen und akuten Wunden. Dank der Silikonwundkontaktschicht lässt sie sich einfach anlegen und nahezu schmerzlos, atraumatisch entfernen. Die Saugkompresse nimmt Exsudat auf und bindet es.

Zusammensetzung
Repsodin Silicone Border hat als Verbandstoffseite außen eine semipermeable Polyurethan-Folie und auf der der Wunde zugewandten Seite eine perforierte Silikonfolie. Zwischen diesen beiden Schichten befindet sich eine Saugkompresse. Diese Schichten werden von einem Acrylkleber zusammengehalten. Die Folie des Verbandstoffes ist luftdurchlässig, aber wasserdicht, sodass Flüssigkeiten nicht durchtreten können. Die perforierte Silikonfolie auf der Wundseite zugewandten Seite ermöglicht ein einfaches Anlegen der Saugkompresse und verhindert das Anhaften an der Wunde. Die Saugkompresse besteht aus einem Schaum aus superabsorbierendem Polyacrylat, um Exsudat aufzunehmen und zu binden, und ist mit hydrophilen Zellulosefasern verstärkt. Sie ist mit einer hydrophilen Polyesterfaser umhüllt (100 % Polypropylen). Die grüne Seite ist immer die wundabgewandte Seite. Auf der anderen Seite ist das Produkt mit einem sehr weichen, hydrophilen Vlies (Viskose und Polyamid) versehen.

Eigenschaften und Wirkungsweise
Repsodin Silicone Border ist eine sterile, selbsthaftende, superabsorbierende Saugkompresse. Dank der mikroabsorbierenden Silikonwundkontaktschicht und den mikroaktiven Kanälen kann sie auch sanft entfernt werden. Die Verbandsaugkompresse ist keimdicht und kann auf Wunden gut verschmiegen und einfach an Körperteilen angelegt werden. Die Saugkompresse nimmt Exsudat auf und bindet es. Das Saugkompressenmaterial aus superabsorbierendem Polyacrylat, um Exsudat aufzunehmen und zu binden, und ist mit hydrophilen Zellulosefasern verstärkt. Sie ist mit einer hydrophilen Polyesterfaser umhüllt (100 % Polypropylen). Die grüne Seite ist immer die wundabgewandte Seite. Auf der anderen Seite ist das Produkt mit einem sehr weichen, hydrophilen Vlies (Viskose und Polyamid) versehen.

Anwendungshinweise
- Die Wunde mit physiologischer Kochsalzlösung oder gemäß ärztlicher Anweisung spülen.
- Die Saugkompresse entsprechend der Wundgröße zuschneiden, sodass die mittige Saugkompresse die Wundränder um mindestens 1 cm – maximal 3 cm überlappt, jedoch nicht zuschneiden. Der durchsichtige Rand kann zugeschnitten werden, um die Saugkompresse z. B. an kurz nach innen gewölbte Körperstellen anzupassen.
- Nach dem Spülen der Wunde und vor dem Auftragen der Saugkompresse darauf achten, dass die umgebende Haut vollständig trocken ist. Tupfen Sie vorsichtig, um die Saugkompresse haftet.
- Beide Schutzfolien abziehen. Die Saugkompresse mit der haftenden Seite auf die Wunde legen, sodass die grüne Seite von der Wunde abgewandt ist.
- Die haftenden Ränder gut andrücken und Falten oder Falten am Rand vermeiden, um sicherzustellen, dass die Saugkompresse sicher fixiert ist.
- Eine zusätzliche Fixierung ist nicht erforderlich. Bei Bedarf können gemäß ärztlicher Anweisung Kompressionsbinden angelegt werden.
- Die Saugkompresse kann 7 Tage auf der Wunde und gelttenden klinischen Protokoll – bis zu 5 Tage auf der Wunde verbleiben.
- Ein Verbandwechsel ist notwendig, wenn dieser klinisch angezeigt ist, oder wenn Exsudat den Rand der Saugkompresse erreicht.

Kontraindikationen
Verwenden Sie Repsodin Silicone Border nicht bei einer Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen
- Die grüne Saugkompresse nicht zuschneiden. Der durchsichtige Rand kann zugeschnitten werden, um die Saugkompresse z. B. an eine nach innen gewölbte Körperstelle anzupassen.
- Vor der Behandlung von infizierten Wunden muss eine klinische Diagnose erstellt werden. Die Behandlung mit Repsodin Silicone Border kann eine Kausalbehandlung der Wundinfektion gegebenenfalls nicht ersetzen. Wenn es klinischen Anzeichen für eine Infektion gibt, muss diese Infektion mit einer geeigneten Behandlung kontrolliert werden, bevor ein weiteres Produkt aufgetragen wird.
- In allen Fällen ist die übliche klinische Vorgehensweise einzuhalten.
- Es sind keine Daten verfügbar, die die Anwendung dieser Saugkompresse bei sensitiven Patientenpopulationen wie Säuglingen, Kindern, Schwangeren oder stillenden Frauen unterstützen, und es liegen ebenfalls keine Daten vor, die dem widersprechen. Die Saugkompresse sollte bei diesen Patientenpopulationen daher nur mit Vorsicht und unter Abwägung der Empfehlung eines Arztes verwendet werden.
- Es ist nicht empfehlenswert, auf der Saugkompresse zu stehen, z. B. bei Wunden an den Füßen.
- Für Saugkompressen, die in Peelpackungen aus Papier/Papier verpackt sind: Die Sterilität der Peelpackung enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen auslösen kann!

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, die zur Verwendung bei einem Patienten bestimmt sind, kann Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage.

Nebenwirkungen
Erhöhte Exsudatmenge, Mazeration, verstärkter Schmerz, Anhalten der Saugkompresse an der Wunde, Jucken, Schmerz, Brennen, Ödeme, möglicherweise Infektionen, Juckreiz, Brennen, Erythem. Wenn eine dieser Nebenwirkungen auftritt, ziehen Sie einen Arzt hinzu.

Meldung von Vorkommnissen
Wenn Ihr Patientendatenschutzrichtlinien in der Europäischen Union und Ländern mit demselben Vorschriften (Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte) während der Verwendung oder infolge der Verwendung dieses Produkts ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, muss dies dem Hersteller bzw. seinem Bevollmächtigten und der nationalen zuständigen Behörde gemeldet werden.

Produktlenstorgung
Um das Risikos potenzieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sollten Verbandmaterialien des Medizinprodukts gemäß den geltenden lokalen Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen sowie den landesspezifischen Infektionspräventionen entsorgt werden. Das Medizinprodukt mit dem Hausmüll entsorgen.

Stand der Information: 2020-03-11

AT — PAUL HARTMANN Austria GmbH – 2355 Wiener Neudorf
CH — HVF HARTMANN AG - 8212 Neuhausen

EN

Instructions for use

Product description
Repsodin Silicone Border is a sterile self-adhesive superabsorbent dressing with a silicone interface for the treatment of moderately to heavily exuding, chronic and acute wounds. The silicone layer in contact with the wound allows easy application and almost painless, atraumatic removal. The absorbent pad absorbs and retains the exudate.

Composition
Repsodin Silicone Border comprises a semi-permeable polyurethane backing film, a perforated silicone film on the side facing the wound and an absorbent pad enclosed in between those two layers. Acrylic adhesive is used to bind these layers together. The backing film is permeable to air but waterproof, which allows the patient to shower. The perforated silicone film facing the wound side facilitates the application of the dressing and promotes non-adherence to the wound. The absorbent pad comprises cellulose and superabsorbent polyacrylate for the absorption and retention of exudate and is wrapped in a hydrophilic cellulose and polyester fibre (100% polypropylene) nonwoven. The green side is always the wound-facing side. On the other side, the product features a very soft, white, hydrophilic nonwoven (viscose and polyamide).

Properties and mode of action
Repsodin Silicone Border absorbs excess exudate and retains it in the absorbent pad. It features a micro-adherent, a silicone interface and borders, so no additional materials are required to secure the dressing. The backing film is bacteria and showerproof. The dressing changes can be carried out atraumatically and almost painlessly.

Intended purpose
Repsodin Silicone Border is a single use sterile self-adhesive superabsorbent dressing with a silicone interface for long-term treatment of injured skin, acute and chronic wounds, with moderate to high exudate. It is intended to be used by health professionals in clinical or homecare environments and can be combined with local antiseptics and secondary dressings.

Indications
Repsodin Silicone Border is suitable for the treatment of wounds with moderate to high levels of exudate: acute wounds (e.g. surgical incision wounds) and chronic wounds (venous ulcer, pressure ulcer, diabetic foot ulcer, tumor).

Mode of application
- Clean the wound using a physiological solution or as instructed by a clinician.
- Choose a suitable dressing size so that the absorbent pad (the central pad) exceeds the edges of the wound by approximately 1 to 2 cm. Do not cut the absorbent green pad. The transparent border can be cut in order to adapt the dressing e.g. to a concave form.
- Before applying the dressing, after rinsing the wound, make sure that the surrounding skin is dry by using swabs to ensure that the dressing adheres.
- Remove the two protective films. Place the adherent side of the dressing onto the wound, so that the green side faces away from the wound.
- Press down the adhesive edges firmly and avoid wrinkles in the border to ensure the dressing stays securely in place.
- No additional fixation is required, if indicated, compression bandages can be applied as instructed by a clinician.
- The dressing can remain on the wound for up to 5 days depending on the condition of the wound and the established clinical protocol.
- The dressing must be changed if clinically indicated or when exudate reaches the rim of the absorbent pad.

Contraindications
Do not use Repsodin Silicone Border in case of hypersensitivity to any of its components.

Special precautions
- Do not cut the absorbent green pad. The transparent border can be cut in order to adapt the dressing e. g. to a concave form.
- Before treating a wound with infection, a clinician has to be consulted to establish a clinical diagnosis. Treatment with Repsodin Silicone Border cannot replace a causal treatment of the wound infection. If there are clinical signs of infection, the infection needs to be controlled with appropriate treatment before this dressing is applied.
- In all cases, follow the established clinical protocol.
- In the absence of available data supporting the use of this dressing on sensitive population groups such as infants, children, pregnant or nursing women, and in the absence of data to the contrary, on these populations this dressing should be used with caution and following a clinician's recommendation.
- It is not recommended to stand on the dressing, e.g. on the wound of wounds on the feet.
- For dressings which are packed in paper-paper-peel packs: The sealed seam of the peel pack contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions!

Reusing a single-use medical device is dangerous. Reprocessing devices, in order to reuse them, may seriously damage their integrity and their performance. Information available on request.

Side effects
Increased exudate, maceration, increased pain, adherence of the dressing to the wound, itching, burning, oedema, possible ulceration, skin tom, blisters, erythema. If any of these occur, consult a clinician.

Incident reporting
For a patient/user/third party in the European Union and in countries with identical regulatory regime (Regulation 2017/745/EU on Medical Devices): If, during the use of this device or as a result, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and/or its authorized representative and to your national authority.

Product disposal
In order to minimize the risk of potential infection hazards, or environmental pollution, disposable components of the medical device should follow disposal procedures according to applicable and local laws, regulations and infection prevention standards. Dispose of the medical device with its household waste.

Date of revision of the IFU: 2020-03-11

AU — PAUL HARTMANN Pty. Ltd. - Macquarie Park, NSW 2113
GB — PAUL HARTMANN Ltd. - Heywood Greater Manchester OL10 2TT
IE — HARTMANN-RICO - Northriding, 2169

FR

Instructions d'utilisation

Description du produit
Repsodin Silicone Border est un pansement superabsorbant auto-adhésif stérile avec interface silicone pour le traitement des plaies modérément à fortement exsudatives chroniques et aiguës. La couche silicone au contact de la plaie permet une application facilitée et un retrait atraumatique et presque indolore. Le coussin absorbant absorbe et retient les exsudats.

Composition
Repsodin Silicone Border comprend un film protecteur externe en polyuréthane semi-perméable, un film de silicone perforé sur le côté tissant face à la plaie et un coussin absorbant entre ces deux couches. Un adhésif acrylique est utilisé pour relier ces couches entre elles. Le film protecteur externe est perméable à l'air mais imperméable à l'eau, ce qui permet au patient de prendre une douche. Le film de silicone perforé côté plaie facilite l'application du pansement et favorise la non-adhérence à la plaie. Le coussin absorbant est composé de cellulose et de polyacrylate superabsorbant permettant l'absorption et la rétention des exsudats et est enveloppé dans un tissu de cellulose hydrophile. Il est recouvert d'un non-tissé hydrophile (100 % polypropylène) très doux, blanc et hydrophile. Le côté vert est toujours le côté tissant face à la plaie. De l'autre côté, le produit est composé d'un nontissé blanc hydrophile et très doux (viscose et polyamide).

Propriétés et mode d'action
Repsodin Silicone Border absorbe les exsudats et les retient dans le coussin absorbant. Le parsement est doté d'une interface en silicone et de bordures micro-adhérentes. Aucun matériau supplémentaire n'est donc requis pour fixer le pansement. Le film protecteur est imperméable aux bactéries et à l'eau lors de la douche. Les renouvellements de pansements peuvent être effectués de manière atraumatique et presque indolore.

Utilisation prévue
Repsodin Silicone Border est un pansement superabsorbant auto-adhésif stérile à usage unique avec une interface silicone pour le traitement à long terme des plaies cutanées aiguës et chroniques, avec des niveaux modérés à élevés d'exsudats. Il est utilisé uniquement chez l'adulte par des professionnels de santé en milieu clinique ou à domicile et peut être associé avec des antiseptiques locaux, des parsements primaires et secondaires.

Indications
Repsodin Silicone Border est indiqué pour le traitement des plaies présentant des exsudats modérés à abondants : plaies aiguës (plaies postopératoires, plaies traumatiques) et plaies chroniques (ulcères veineux, escarres, plaies diabétiques, plaies tumorales).

Mode d'application
- Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique ou selon la prescription médicale.
- Choisir la taille du pansement adaptée à la plaie en veillant à ce que le coussin central dépasse d'environ 1 à 2 cm les bords de la plaie. Ne couper le coussin vert absorbant. La bordure transparente peut être découpée afin d'adapter le pansement, par ex. à une forme concave.
- Avant de poser le pansement, après rinçage de la plaie, veiller à bien sécher le pourtour de la plaie à l'aide de compresses afin de pouvoir garantir l'adhérence du pansement.
- Retirer les deux feuillets protecteurs. Poser la face adhérente du pansement côté plaie, de manière à ce que la face verte soit opposée à la plaie.
- Appuyez fermement sur les bords adhésifs et éviter les plis dans la bordure pour que le pansement reste bien en place.
- Aucune fixation supplémentaire n'est requise. Si nécessaire, des bandages de compression peuvent être appliqués conformément aux instructions d'un médecin.
- Le pansement peut rester sur la plaie pendant 5 jours au maximum, en fonction de l'état de la plaie et du protocole clinique instauré.
- Le renouvellement du pansement s'effectuer si des signes cliniques l'imposent ou lorsque les exsudats apparaissent au niveau des bords du coussin absorbant.

Contre-indications
Ne pas utiliser Repsodin Silicone Border en cas d'hypersensibilité à l'un des composants.

Précautions particulières
- Ne pas couper le coussin vert absorbant. La bordure transparente peut être découpée afin d'adapter le pansement, par ex. à une forme concave.
- Avant tout traitement d'une plaie infectée, un médecin doit établir un diagnostic clinique. Le traitement avec Repsodin Silicone Border ne remplace pas le traitement étiologique du retard de cicatrisation. En présence de signes cliniques d'infection, l'utilisation de ce pansement nécessite la maîtrise préalable de l'infection par un traitement approprié.
- Dans tous les cas, suivre le protocole clinique instauré.
- En l'absence de données disponibles sur l'utilisation de ce pansement sur des populations sensibles telles que les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes et en l'absence de données contraires, l'utilisation de ce pansement sur ces populations doit se faire avec précaution et en suivant les recommandations d'un médecin.
- Il n'est pas recommandé de se tenir debout sur le pansement, par exemple en cas de plaies aux pieds.
- Pour les pansements conditionnés en sachets pelables papier-papier : le scellage (bande bleue) du sachet pelable contient du latex naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques !

La réutilisation d'un dispositif médical à usage unique est dangereuse. Le traitement des dispositifs en vue de leur réutilisation peut gravement nuire à leur intégrité et à leurs performances. Informations fournies sur demande.

Effets secondaires
Augmentation des exsudats, macération, augmentation de la douleur, adhérence du pansement à la plaie, démangeaison, brûlure, œdème, ulcération multiple, avulsion de la peau, phlyctène, érythème. En cas d'apparition d'un de ces effets indésirables, consulter un médecin.

Signalement des incidents
Pour un patient/utilisateur / tiers dans l'Union européenne et dans les pays ayant un régime réglementaire identique (Règlement (EU) 2017/745 sur les dispositifs médicaux) : si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou suite à son utilisation, un incident grave se produit, veuillez le signaler au fabricant et/ou à son représentant légal autorisé et à votre autorité nationale.

Élimination du produit
Afin de réduire le risque d'infections potentielles ou de pollution environnementale, les composants jetables du dispositif médical doivent être éliminés conformément aux lois, réglementations et normes en vigueur en matière de contrôle des infections. Éliminer le dispositif médical avec les ordures ménagères.

Date de dernière révision de la notice : 2020-03-11

FR — Lab. PAUL HARTMANN S.A.r.l. - Châtenois — 67607 Sélestat CEDEX

NL

Gebruiksaanwijzing

Productbeschrijving
Repsodin Silicone Border is een steril zelfklevend, superabsorberend kompres met siliconenlaag voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende, chronische en acute wonden. De siliconenlaag zorgt voor een gemakkelijke aanbrenging en een bijna pijnloos en atraumatisch kan worden verwijderd. Het absorberende wondkompres zuigt het wondvocht op en bindt het.

Samenstelling
Repsodin Silicone Border bestaat uit een halfdoorlatende achterlaag van polyurethaan, een geperforeerde siliconenlaag aan de zijde in de aanraking komt met de wond, en een absorberend wondkompres dat is ingesloten tussen deze twee lagen. De lagen worden aan elkaar bevestigd door middel van acrylkleefstof. De achterlaag is luchtdoorlatend, maar waterdicht, zodat de patiënt een douche kan nemen. De geperforeerde siliconenlaag aan de zijde die in aanraking komt met de wond, zorgt ervoor dat het kompres eenvoudig kan worden aangebracht en zich niet hecht aan de wond. Het absorberende wondkompres bestaat uit cellulose en superabsorberend polyacrylaat voor de absorptie en retentie van exsudaat, en is in hydrofiel cellulosepolyesterweefsel gewikkeld. Het bestaat uit heel zacht, hydrofiel, niet-geweven (100% polypropyleen) dat de zijde aangeeft die in aanraking komt met de wond. Het product is voorzien van een zeer zacht, wit, hydrofiel niet-geweven kroon en polyamide) aan de andere zijde.

Eigenschappen en werking
Repsodin Silicone Border absorbeert exsudaat en houdt dit vast in het absorberende wondkussen. Het bevat een microklevende siliconenlaag en microklevende randen, zodat er geen extra materiaal nodig is om het verband te fixeren. De achterlaag is bacteriedicht. Het wisselen van het kompres kan atraumatisch en bijna pijnloos worden uitgevoerd.

Beoogd gebruik
Repsodin Silicone Border is een steriel zelfklevend, superabsorberend kompres met een siliconenlaag voor eenmalig gebruik voor langdurige behandeling van acute en chronische, matig tot sterk exsuderende wonden. Het is bestemd voor gebruik door professionele zorgverleners in een klinische omgeving of in de thuiszorg en kan worden gecombineerd met lokale antiseptica, primaire en secundaire kompressen.

Indicaties
Repsodin Silicone Border is geschikt voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende wonden: acute wonden (bijvoorbeeld chirurgische wonden) en chronische wonden (veneuze zweren, doorliggwonden, diabetische voetwonden, tumoren).

Wijze van aanbrenging
- Maak de wond schoon met behulp van een fysiologische oplossing of volgens de instructies van een arts.
- Kies een kompres met dit juiste maat voor de wond, zodat het centrale wondkussen ongeveer 1 tot 2 cm uitsteekt over de randen van de wond. Het groene, absorberende wondkussen mag niet worden bijgeknipt. De transparante rand kan worden bijgeknipt om het kompres aan te passen aan bijvoorbeeld een concave vorm.
- Na het spoelen van de wond moet eerst de huid rond de wond met wattenstaafjes worden afgedroogd voordat het kompres kan worden aangebracht, anders hecht het kompres zich niet.
- Verwijder de twee beschermfolies. Plaats de klevende zijde van het kompres op de wond, met de groene kant van de wond. Het groene, absorberende wondkussen mag niet worden bijgeknipt. De transparante rand kan worden bijgeknipt om het kompres aan te passen aan bijvoorbeeld een concave vorm.
- Na het spoelen van de wond moet eerst de huid rond de wond met wattenstaafjes worden afgedroogd voordat het kompres kan worden aangebracht, anders hecht het kompres zich niet.
- Verwijder de twee beschermfolies. Plaats de klevende zijde van het kompres op de wond, met de groene kant van de wond.
- Druk de kleefranden goed aan en zorg ervoor dat er geen plooien in de rand komen, zodat het kompres goed zit en blijft plakken.
- Er is geen extra fixatiemiddel nodig. Indien nodig kan er op aanwijzing van een arts een compressieverband worden aangebracht.
- Het kompres kan maximaal 5 dagen op de wond blijven, afhankelijk van de conditie van de wond en met behulp van het gebruikelijke klinische protocol.
- Het kompres moet worden vervangen indien dit klinisch wordt geïndiceerd of wanneer het exsudaat de rand van het absorberende wondkussen bereikt.

Contra-indicaties
Gebruik Repsodin Silicone Border niet in geval van overgevoeligheid voor één of meerdere bestanddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen
- Het groene, absorberende wondkussen mag niet worden bijgeknipt. De transparante rand kan worden bijgeknipt om het kompres aan te passen aan de wond, bijvoorbeeld bij een concave wond.
- Raadpleeg een arts voor een klinische diagnose voordat u een chronische wond gaat behandelen. De behandeling met Repsodin Silicone Border is geen vervanging voor causale therapie voor een chronische wond. Als er klinische symptomen van infectie zijn, moet de infectie worden behandeld met een geschikte behandeling voordat dit kompres kan worden gebruikt.
- Volg in alle gevallen de standaardaanpak die hiervoor nog van toepassing is.
- Bij gebrek aan beschikbare gegevens die het gebruik van dit kompres bij kwetsbare bevolkingsgroepen zoals zuigelingen, kinderen en vrouwen die zwanger zijn of of borstvoeding geven, ondersteunen, en bij gebrek aan gegevens die het tegendeel bewijzen moeten dit kompres bij deze bevolkingsgroepen voorzichtig gebruikt te worden en op advies van een arts.
- Het wordt niet aanbevolen op het kompres te staan, bijv. bij wonden op de voet.
- Voor kompressen die verpakt zijn in papieren peelpacks: de sealnaad van de peelpack bevat latexrubber dat allergische reacties kan veroorzaken!

Hergebruik van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het herverwerken van hulpmiddelen voor hergebruik kan de integriteit en de prestatie van de producten aanzienlijk schaden. Meer informatie op aanvraag.

Bijwerkingen
Toenemend exsudaat, maceratie, verhoogde pijn, wondverkleving, jeuk, brandend gevoel, oedeem, meerdere zweren, huidscheuren, blaren, erythem. Raadpleeg een arts als een van deze bijwerkingen optreedt.

Incidenten melden
Voor patiënten/gebruikers/derde partijen in de Europese Unie en in landen met dezelfde regelgeving (Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen): ernstige incidenten die zich in verband met het gebruik van het hulpmiddel of als een resultaat van het gebruik ervan hebben plaatsgevonden, dienen te worden gemeld bij de fabrikant en/of de bevoegde vertegenwoordiger en uw nationale autoriteit.

Afvoeren van het product
Om het risico op infectiegevaar of milieuverontwijling te minimaliseren, moeten voor de wegwerpcomponenten van het medische hulpmiddel de procedures voor afvoer worden gevolgd overeenkomstig de geldende en lokale wetgeving, regels en normen voor infectiepreventie. Voer het medische hulpmiddel met het huishoudelijk afval.

Datum van de laatste aanpassing van deze tekst: 2020-03-11

BE – N.V. PAUL HARTMANN S.A. - 1480 Saintes/Sint-Renelde
NL – PAUL HARTMANN B.V - 6546 BC Nijmegen

IT

Istruzioni per l'uso

Descrizione del prodotto
Repsodin Silicone Border è una compressa superassorbente auto-adesiva sterile con un'interfaccia di contatto in silicone per il trattamento di ferite croniche e acute con essudazione da moderata a elevata. Lo strato di silicone a contatto con la ferita fa in modo che consente la facile applicazione, nonché la rimozione quasi indolore e atraumatica. La compressa assorbente cattura l'essudato e lo trattiene.

Composizione
Repsodin Silicone Border comprende una pellicola semipermeabile di fondo in poliuretano, una pellicola traforata in silicone sul lato rivolto verso la ferita e una compressa assorbente tra questi due strati. Collanti acrilici tengono insieme questi strati. La pellicola di fondo è permeabile all'aria ma impermeabile all'acqua, permette il paziente può lavarsi. La pellicola traforata in silicone sul lato rivolto verso la ferita facilita l'applicazione della compressa e impedisce l'adesione alla ferita. La compressa assorbente è realizzata in cellulosa e poliacrilato superassorbente per l'assorbimento e la ritenzione dell'essudato ed è avvolta in un tessuto di cellulosa idrofila. È ricoperta da non tessuto (100% polipropilene) idrofobo verde che rende riconoscibile il lato a contatto con la ferita. Sul lato opposto il prodotto presenta un non tessuto molto morbido e idrofilo bianco (viscosa e poliammide).

Proprietà e modo di azione
Repsodin Silicone Border assorbe l'essudato e lo trattiene nella compressa assorbente. Presenta un'interfaccia e bordi microadesivi in silicone, pertanto non servono altri materiali per fissare la compressa. La pellicola di fondo è impermeabile ai batteri e all'acqua. La sostituzione della compressa è atraumatica e non comporta quasi alcun dolore.

Destinatarione d'uso
Repsodin Silicone Border è una compressa superassorbente autoadesiva sterile monouso con un'interfaccia in silicone per il trattamento a lungo termine di ferite acute e croniche, da moderatamente a molto essudative. Deve essere applicata solo sulla pelle integra da operatori sanitari in ambienti clinici o domestici e può essere combinata con antisettici locali, compresse secondarie.

Indicazioni
Repsodin Silicone Border è indicato per il trattamento di ferite con livelli di essudato medio-alti: ferite acute (suture), ferite post-operative, ferite traumatiche) e ferite croniche (ulcera venosa, ulcera da decubito, ulcera diabetica, tumori).

Modalità di applicazione
- Pulire la ferita utilizzando una soluzione fisiologica o seguendo le indicazioni fornite da un medico.
- Scegliere una compressa di misura idonea per la ferita, assicurandosi che la compressa centrale assorbente sporga di circa 1-2 cm dalla ferita. Non tagliare la compressa assorbente verde. Il bordo trasparente può essere tagliato per adattare la compressa, ad es. a forme concave.
- Prima di applicare la compressa, dopo aver pulito la ferita, asciugare con la pelle circostante con delle garze per garantire che la compressa aderisca.
- Rimuovere i due fogli protettivi. Posizionare la compressa con il lato adesivo sulla ferita, in modo che il lato di colore verde sia rivolto sul lato opposto.
- Premere bene i bordi adesivi esercitando pressione per garantire che la compressa non si sposti.
- Non è necessario fissare la compressa in altro modo; se indicato da un medico, è possibile applicare delle bende.
- La compressa può rimanere applicata sulla ferita per massimo 5 giorni, a seconda delle condizioni della ferita stessa e del protocollo clinico stabilito.
- La compressa deve essere sostituita se clinicamente indicato o quando l'essudato raggiunge il bordo della compressa assorbente.

Controindicazioni
Non utilizzare Repsodin Silicone Border in caso di ipersensibilità a uno dei suoi componenti.

Precauzioni particolari
- Non tagliare la compressa assorbente verde. Il bordo trasparente può essere tagliato per adattare la compressa, ad es. in una forma concava.
- Prima di trattare una ferita con difficoltà di guarigione, è necessario consultare un medico per definire una diagnosi clinica. Il trattamento con Repsodin Silicone Border non può sostituire un trattamento causale della difficoltà di guarigione della ferita. Se sono presenti segni clinici di infezione, l'infezione deve essere controllata con adeguato trattamento prima di poter usare la compressa.
- In tutti i casi, seguire il protocollo clinico stabilito.
- In assenza di dati a supporto dell'utilizzo di tale compressa su gruppi di popolazione sensibili come neonati, bambini, donne in gravidanza o in fase di allattamento, e in assenza di dati contrari a tale utilizzo, la compressa deve essere impiegata con cautela sui tali soggetti, seguendo le indicazioni di un medico.
- Non è consigliabile stare in piedi sulla compressa, ad esempio in caso di ferite ai piedi.
- Per compresse confezionate in peel-pack carta-carta: La confezione interna è sigillata con lattice naturale, il quale può provocare reazioni allergiche!

Il riutilizzo di un dispositivo medico monouso è pericoloso. Riprocessare i dispositivi al fine di un riutilizzo potrebbe danneggiare gravemente la loro integrità e le loro prestazioni. Informazioni disponibili su richiesta.

Effetti collaterali
Aumento dell'essudato, maceration, aumento del dolore, compressa attaccata alla ferita, prurito, bruciore, edema, ulcerazione multipla, lacerazione cutanea, vesciche, eritema. In caso di comparsa di uno di questi effetti collaterali, consultare un medico.

Segnalazione di incidenti
Per un paziente/utilizzatore/terzi nell'Unione europea e in paesi con regime normativo identico (Regolamento 2017/745/UE sui dispositivi medici): se durante l'uso di questo dispositivo o come risultato del suo utilizzo, si è verificato un incidente grave, segnalare quest'ultimo al fabbricante e/o ai suoi rappresentanti autorizzati e alla relativa autorità nazionale.

Smaltimento del prodotto
Per ridurre il rischio di potenziali pericoli di infezione o di inquinamento ambientale, i componenti monouso del dispositivo medico devono essere smaltiti secondo le procedure di smaltimento in conformità alle leggi locali vigenti e a norme, regolamenti e standard di prevenzione delle infezioni. Smaltire i dispositivi medici con i rifiuti domestici.

Data di revisione del testo: 2020-03-11

IT — PAUL HARTMANN S.p.A. - 37139 Verona

ES

Instrucciones de uso

Descripción del producto
Repsodin Silicone Border es un apósito estéril adhesivo superabsorbente con capa de contacto de silicona para el tratamiento de heridas agudas y crónicas con niveles de exudado moderados a abundantes. La capa de silicona en contacto con la herida permite una aplicación fácil y prácticamente indolora y una retirada atraumática. La almohadilla absorbente absorbe y retiene el exudado.

Composición
Repsodin Silicone Border contiene una lámina de poliuretano semipermeable de base, una lámina de silicona perforada en el lado de la herida y una almohadilla absorbente entre estas dos capas. El adhesivo acrílico permite unir las capas. La lámina de base es permeable al aire, pero impermeable al agua, para que el paciente pueda ducharse. La lámina de silicona perforada del lado de la herida facilita la aplicación del apósito y evita la adhesión a la herida. La almohadilla absorbente está compuesta de celulosa y poliacrilato superabsorbente para la absorción y la retención de exudado, y va envuelta en un tejido de celulosa hidrófila. Está cubierta por un tejido no tejido hidrófobo verde (100 % polipropileno), para señalar el lado adyacente de la herida. Por el otro lado, el producto cuenta con un tejido no tejido hidrófilo muy suave y de color blanco (viscosa y poliamida).

Características y principio de acción
Repsodin Silicone Border absorbe y retiene el exudado en la almohadilla absorbente. Tiene bordes y una capa de contacto microadhesivos, por lo que no se necesitan más materiales para fijar el apósito. La lámina de base es impermeable a gases y para la ducha. El apósito se puede cambiar con poco dolor o molestias, de forma prácticamente atraumática.

Uso previsto
Repsodin Silicone Border es un apósito estéril adhesivo superabsorbente y de brechado con capa de silicona para el tratamiento a largo plazo de piel con heridas graves y crónicas, con niveles de exudado de moderados a elevados. Se utiliza exclusivamente en adultos por parte de profesionales sanitarios en entornos hospitalarios o domésticos. El apósito puede utilizarse junto con antisépticos locales y apósitos secundarios.

Indicaciones
Repsodin Silicone Border está indicado para el tratamiento de heridas con niveles de exudado de moderados a abundantes: heridas agudas (heridas quirúrgicas) y heridas crónicas (úlceras venosas, úlceras de presión, úlceras diabéticas, tumores).

Modo de aplicación
- Limpie la herida con suero fisiológico o según las indicaciones del médico.
- Elija un tamaño de apósito adecuado para que la almohadilla absorbente central sobresalga entre 1 y 2 centímetros aprox. de los bordes de la herida. No corte la almohadilla absorbente verde. Los bordes transparentes pueden cortarse para adaptar el apósito, por ejemplo, a una forma cóncava.
- Antes de aplicar el apósito, después de limpiar la herida, compruebe que la piel circundante esté seca con gasas, para garantizar la adhesión del apósito.
- Retire los dos láminas protectoras. Aplique el apósito de lado adherente sobre la herida, de forma que el lado verde quede en el lado opuesto a la herida.
- Presione con firmeza los bordes adhesivos y evite que se formen pliegues, para asegurarse de que el apósito permanece bien colocado.
- No se requiere fijación adicional. Si es necesario, deberán aplicarse vendajes de compresión, según las indicaciones de un médico.
- El apósito puede permanecer en la herida durante 5 días, en función del estado de la herida y del protocolo clínico establecido.
- El apósito debe cambiarse si así está indicado por el médico o si el exudado rebasa de la almohadilla absorbente.

Contraindicaciones
No utilice Repsodin Silicone Border en caso de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

Precauciones especiales
- No corte la almohadilla absorbente de color verde. El borde transparente puede cortarse para adaptar el apósito, por ejemplo, a una herida cóncava.
- Antes de tratar una herida difícil de cicatrizar, es necesario consultar a un médico para que diagnostique la herida. El tratamiento con Repsodin Silicone Border no puede sustituir una terapia causal de los trastornos que afectan el proceso de cicatrización de la herida. Si existen signos clínicos de infección, se debe controlar con el tratamiento adecuado antes de utilizar el apósito.
- Siga siempre el protocolo clínico establecido.
- Ante la falta de datos que respalden el uso de este apósito en grupos sensibles como bebés, niños, embarazadas o mujeres en lactancia, y ante la falta de datos que indiquen lo contrario, el apósito se debe utilizar con precaución en estos grupos y de acuerdo con la recomendación de un médico.
- No se recomienda estar de pie sobre el apósito, por ejemplo, en caso de heridas en los pies.
- En el caso de apósitos envasados en sobres de papel-papel (pelable): el sellado (banda azul) del sobre de este producto contiene látex natural susceptible de provocar reacciones alérgicas!

La peligrosa reutilización sanitario de un sólo uso. Reprocesar los productos para volver a utilizarlos puede dañar seriamente su integridad y su rendimiento. Información disponible previa solicitud.

Efectos secundarios
Aumento del exudado, maceración, aumento del dolor, adherencia del apósito a la herida, picor, escozor, edemas, ulceración múltiple, desgarro de la piel, ampollas, eritema. Si se produce cualquiera de estos efectos secundarios, consulte a un médico.

Notificación de incidentes graves
Para pacientes/usuarios/terceros de la Unión Europea y países con idéntico marco normativo (Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios): en caso de que durante el uso de este dispositivo o como resultado del mismo, se produzca un incidente grave, deberá notificarse al fabricante y/o su representante autorizado y a la autoridad nacional correspondiente.

Eliminación del producto
A fin de reducir el riesgo de posibles infecciones o de contaminación medioambiental, los componentes desechables de los productos sanitarios deben seguir los procedimientos de eliminación establecidos por la normativa y legislación vigentes aplicables, así como por las normas de prevención de infecciones. Elimine el producto sanitario con la basura doméstica.

Fecha de revisión del texto: 2020-03-11

ES — Laboratorios HARTMANN S.A. - 08302 Mataró

PT

Instruções de utilização

Descrição do produto
Repsodin Silicone Border é uma compressa superabsorvente autoadesiva estéril, com uma camada de contacto em silicone para o tratamento de feridas agudas, crónicas e exsudativas de nível moderado/grave. A camada de silicone em contacto com a ferida permite uma aplicação fácil e uma remoção praticamente indolor e sem trauma. O disco absorvente absorve e retém o exsudado.

Composição
Repsodin Silicone Border inclui uma película semipermeável de poliuretano na face posterior, uma película de silicone perfurada no lado da ferida e um disco absorvente entre estas duas camadas. É utilizado adesivo acrílico para manter estas camadas fixas entre si. A película na face

до образуването на рана. Ако има клинични признаци на инфекция, тя трябва да бъде незабавно лекувана с подходящо лечение преди използването на този компрес.
• Във всички случаи следвайте установените клинични протоколи.
• При липса на наличие данни относно употребата на този компрес при специални групи пациенти като бременност, кърмене, педиатрична болна, деца, бременни или кърмещи жени, и при липса на данни за облъчването в тези групи от населението този компрес трябва да се използва с повишено внимание и по медицинска преценка.
• Не се препоръчва да се стъпва върху компреса, напр. в случай на рани по стъпалото.
• За компреса, който са опаковани в стерилна опаковка изцяло от катран: топлинното запечатване на тази опаковка съдържа естествен катран, който може да предизвика алергични реакции.

Повторната употреба на медицинско изделие за единократна употреба е опасна. Повторната обработка на изделието с цел повторна употреба може сериозно да намали неговата цялост и/или функционалност, което потенциално може

Справочник ефекти
Повишено количество ексудат, мацерация, усещане на болката, пренасяне на компреса към рамото, сърбеж, парене, едем, множествени язви, разкъсване на кожата, мехури, кървене. Консултирайте се с лекар, ако възникне някой от тези странични ефекти.

Съобщаване на инциденти
За пациентите/потребителите: страна в Европейския съюз и в страни с идентични регулаторни режими (Регламент 2017/745/ЕС за медицинските изделия): ако по време на използването на това изделие или в резултат на неговото използване е възникнал сериозен инцидент, моля, докладвайте го на производителя и/или упълномощения му представител и на вашия национален орган.

Изхвърляне на продукта
С цел да се намали рискът от възможна опасност от инфекция или замърсяване на околната среда компонентите на медицинското изделие трябва да следват процедурите за изхвърляне съгласно местни закони, правила, разпоредби и стандарти за предприятие от информация. Изхвърляйте медицинското изделие с бетови отпадъци.

Дата на актуализиране на текста: 2020-03-11

BG — ТІ ХАРТМАНН-РЯНО - 1113 София

Upute za uporabu

Opis proizvoda
Resposorb Silicone Border sterilni je samoljepljivi superupijajući zavoj sa silikonskim površinskim slojem namijenjen upravljanju sa slabo do umjereno eksudirajućim pjegm ekvalizacijom. Silikonski sloj u dodiru s ranom omogućuje jednostavno stavljanje i gotovo bezbolno uklanjanje bez oštećenja novoformiranog epitela. Upijajući sloj upija i zadržava eksudat.

Sastav
ResposorbSilicone Border sastoji se od poliuretanskog superupijajućeg pozadinskog filma, filma od perforiranog silikona na strani okrenutoj prema rani i upijajućeg sloja između ta dva sloja. Za povećanje upijajućeg kapaciteta i omogućavanje isparavanja tekućine film propušta zrak, ali je vodonepropustan, što jasciteta omogućuje tuširanje. Film od perforiranog silikona sprječava prianjanje zavoja uklanjanje stavljanje zavoja i pomaže pri sprječavanju ljepljenja za ranu. Upijajući jastučić sastoji se od celuloze i superupijajućeg poliakrilata te upija i zadržava eksudat. Jastučić Silicone Border nije prikladan za primjenu s proizvodima na bazi zelenim reklamnim materijalom (100 % poliuretan) koji označava stranu koja se treba adhezivi u stanju upijanja eksudata i ne može se vratiti u prvobitno stanje. S druge strane nalaze se vrlo mekan bijeli hidrofili materijal (viskoza i poliamid).

Svojstva i način djelovanja
ResposorbSilicone Border upija eksudat i zadržava ga u upijajućem jastučiću. Oblikuje se mikrookruženje silikonskim površinskim slojem i obrubom, pa za učinkovitije zavoja mišu potrebnim nikakav dodatni materijali. Pozadinski je film neprobojan za bakterije i vodu prilikom tuširanja. Promjene zavoja mogu se izvoditi bez oštećenja tkiva i gotovo bezbolno.

Namjena
ResposorbSilicone Border sterilan je samoljepljivo superupijajući zavoj za jednokratnu upotrebu sa silikonskim površinskim slojem namijenjen upravljanju sa slabo do umjereno eksudirajućim pjegm ekvalizacijom. Silikonski sloj u dodiru s ranom omogućuje jednostavno stavljanje i gotovo bezbolno uklanjanje bez oštećenja novoformiranog epitela. Upijajući sloj upija i zadržava eksudat.

Indikacije
ResposorbSilicone Border primjenjen je za liječenje rana s umjerenom do visokom razinom eksudata. Što obuhvaća akutne (opekline, post-operativne i traumatske rane) i kronične rane (venski vrijed, dekubitalni vrijed, vrijed kod dijabetičkog stopala).

Način primjene
- Ranu očistite fiziološkom otopinom ili drugim opcijama liječenja.
- Oštećenu vršnu zavoja koju odgovara ram pazeći da sterilnog jastučić prelazi preko nabova rane za otprilike 1 – 2 cm. Nemojte rezati upijajući zeleni jastučić. Prozirni se dijelovi može rezati da bi se prilagodili obliku rane. Koristite samo čiste, suhe i oštre škare.
- Prije stavljanja zavoja, a nakon njezina rane, tuferom provjerite je li okolna koža čista i suha. Ako je potrebno, koži obrijte.
- Odstranite sloj zaštitne folije i stavljanje zavoja položite na ranu tako da zelena strana bude okrenuta na suprotnu stranu.
- Čvrsto pritisnite rubove, a naročito uglove i izbjegavajte nabore na obrubu kako biste osigurali da zavoj ostane čvrsto na ravne mjesta.
- Nije potrebno nikakvo dodatno učvršćivanje; po potrebi za primjena upotrijebi ljepljenja mogu primijeniti kompresni zavoj.
- Zavoj može ostati na rani do 5 dana, ovisno o stanju rane i ustaljenom kliničkom protokolu.
- Zavoj se može promijeniti ako je to klinički indicirano ili kada eksudat dopre do ruba upijajućeg jastučića.

Kontraindikacije
ResposorbSilicone Border nemojte koristiti u slučaju preosjetljivosti na bilo koju od njegovih komponenti.

Posebne mjere opreza
- Nemojte rezati upijajući zeleni jastučić. Prozirni se obrub može rezati da bi se zavoj prilagodio npr. konkavnom obliku.
- Prije odstranjivanja vanjskog zaštitnog omotača provjerite je li sterilna barijera neoštećena. Ako je neoštećena, sterilnost se može smatrati zajamčenom.
- Ako se pojavi znakove infekcije, posavjetujte se s liječnikom.
- Za zavoje u papirnatom omotaču pakiranju: zatvoreni čak na pakiranju sadrži prirodni gumeni lateks, koji može uzrokovati alergijske reakcije!

Opasno je ponovno upotrebljavati jednokratne medicinske proizvode. Ponovnom procesiranju radi ponovne upotrebe može se oštetiju oštetiti njihova cjelovitost i/ili rad. Informacije su dostupne na zahtjev.

Nuspojave
Prpurian eksudat, maceracija, pojačana bol, ljuštjenje zavoja za ranu, svrbež, peckenje, edem, višestruki mjehurići, pojavljivanje nastora i mjehurića na koži, edem. Ako primijetite bilo koju od tih nuspojava, posavjetujte se s ljekarnikom.

HR — Tri LIKTMANN-PRVO - 1113 Cvjetna

Prijava incidenata
Za pacijenta / korisnika / treću stranu u Europskoj uniji i zemljama s istim regulatornim režimom (Uredba 2017/745/EU o medicinskim proizvodima): ako tijekom upotrebe ovog proizvoda ilog ili upotrebe došlo do ozbiljnog incidenta, prijavite ga proizvođaču i/ili njegovu ovlaštenom predstavniku te nadležnom nacionalnom tijelu vlasti.

Zbrinjavanje proizvoda
Da bi se rizik povezan s opasnošću od moguće infekcije ili zagađenjem okoliša svelo na najmanju moguću mjeru, za jednokratne komponente ovog medicinskog proizvoda morajo se poštivati procedure zbrinjavanja u otpadu u skladu s propisima i lokalnim zakonima, pravilima, smjernicama i standardima spričevanja zarave. Ovaj proizvod se može zbrinjavati s kućanskim otpadom.

Datum revizije teksta: 2020-03-11

HR — Paul Hartmann d.o.o. - 10020 Zagreb

Instrucțiuni de utilizare

Descrierea produsului
ResposorbSilicone Border este un pansament steril, superabsorbant, autoadeziv, pentru tratarea plăgilor moderat sau puternic exsudative, acute și cronice. Stratul din silicon care vine în contact cu rana facilitează îndepărtarea fără traumatizarea țesutului nou-format. Stratul absorbant reține exsudatul. Pelicula semipermeabilă este rezistentă la bacterii și apă. Schimbarea pansamentului poate fi efectuată în mod sigur și aproape nedureros.

Indicații de utilizare
ResposorbSilicone Border este un pansament superabsorbant, steril, autoadeziv, de unică folosință, cu o interfață din silicon, concept pentru tratarea leziunilor de piele, a plăgilor acute și cronice, cu exsudație moderată sau puternică, cum ar fi: plăgi postoperatorii, plăgi traumatice, arsuri ușoare, plăgi de cădere pentru ulcere, plăgi de staza venoasă, plăgi de presiune, plăgi diabetice.

Contraindicații
Nu utilizați ResposorbSilicone Border în cazul în care sunteți alergic la oricare dintre componentele acestuia.

Măsuri speciale de precauție
- Nu folosiți tampoane cu conținut verde. Margineа transparentă poate fi tăiată, pentru a adapta pansamentul, de ex. la formă concavă.
- Înainte de tratarea unei plăgi infectate, cu cât timp de vindecare deficitar, trebuie consultat un medic clinician în vederea stabilirii unui diagnostic clinic. Tratamentul antiinfecțios trebuie început înainte de aplicarea acestui pansament pentru tratamentul unei plăgi infectate. Dacă există simptome clinice de infecție, aceasta trebuie controlată cu un tratament adecvat înainte de aplicarea pansamentului.
- Pansamentul poate rămâne pe plagă cel mult 5 zile, în funcție de starea plăgii și de protocolul clinic.
- Pansamentul trebuie schimbat la indicația clinicii sau când exsudatul devine vizibil pe marginea tamponului.

Contraindicații
Nu utilizați ResposorbSilicone Border în caz de hipersensibilitate la oricare dintre componentele acestuia.

Măsuri speciale de precauție
- Nu folosiți tampoane cu conținut verde. Margineа transparentă poate fi tăiată, pentru a adapta pansamentul, de ex. la formă concavă.
- Înainte de tratarea unei plăgi infectate, cu cât timp de vindecare deficitar, trebuie consultat un medic clinician în vederea stabilirii unui diagnostic clinic. Tratamentul antiinfecțios trebuie început înainte de aplicarea acestui pansament pentru tratamentul unei plăgi infectate. Dacă există simptome clinice de infecție, aceasta trebuie controlată cu un tratament adecvat înainte de aplicarea pansamentului.
- Pansamentul poate rămâne pe plagă cel mult 5 zile, în funcție de starea plăgii și de protocolul clinic.
- Pansamentul trebuie schimbat la indicația clinicii sau când exsudatul devine vizibil pe marginea tamponului.

Contraindicații
Nu utilizați ResposorbSilicone Border în caz de hipersensibilitate la oricare dintre componentele acestuia.

Porocanje o zapletih
Za bolnikovposvetovalnitrepžo osebo v Evropski uniji in državah z identično regulativno ureditvijo (Uredba 2017/745/EU o medicinskih pripomočkih): če med uporabo tega pripomočka ali zaradi njegove uporabe pride do resnega zapleta, o tem obvestite proizvajalca in/ali pooblaščenega zastopnika ter pristojni državni organ.

Odstranjevanje izdelka
Za zmanjšanje nevarnosti okužanja okolja ali onesnaževanja okolja morate pri odstranjevanju komponent tega medicinskega pripomočka upoštevati postopke odstranjevanja v skladu z veljavnimi in lokalnimi zakoni, pravili, predpisi in standardi proizvajalca ovoja. Medicinski pripomoček odvrzite med gospodinjske odpadke.

Datum zadnje revizije besedila: 2020-03-11

SI — PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o. - 1000 Ljubljana

Bruksanvisning

Produktbeskrivning
ResposorbSilicone Border är ett sterilt självhäftande superabsorberande förband med silikonskikt för behandling av akuta och kroniska sår med måttlig till stor exsudatproduktion. Silikonskiktet i kontakt med såret underlättar smärtfritt borttagande utan att traumatisera nybildad vävnad. Den absorberande delen absorberar och håller kvar exsudatet.

Sammansättning
ResposorbSilicone Border innehåller en halvgenomsläpplig polyuretanbaserad bakdukt, en perforerad silikonskiva mot såradan och en absorberande del av bomull och fiberpolyester. Absorptionsförmågan ökas genom att förbandet släpper igenom fukt och luft men är vattentätt, vilket möjliggör att patienten kan duscha. Det perforerade silikonskiktet och den absorberande delen innehåller cellulosa och superabsorberande polymer. Förbandet är latexfritt och innehåller inga ämnen som är klassificerade som miljöfarliga. Det är antiallergiskt och har visat sig vara mycket väl tolererat. Förbandet är mjukt och anpassar sig väl till kroppens konturer och kan användas utan problem mycket mjuk, vit, hydrofil och silkeslen lookas och polyamid).

Egenskaper och verkan
ResposorbSilicone Border absorberar och håller kvar exsudatet i den absorberande delen. Kontaktytor och kanter består av mikrohäftbarriär silikon. Det ökas inget ytterligare material för att sårka förbandet. Tran på baksidan skyddar mot bakterier och tillåter duschning. Förbandsbytena kan göras atraumatiskt och nästan smärtfritt.

Avsedd användning
ResposorbSilicone Border är ett superabsorberande, självhäftande och sterilt engångsförband med silikonskiva för längtidsbehandling av skadad hud, akuta och kroniska sår med måttligt till stora mängder exsudat. Det används enbart på svåra patienter av vårdpersonal i institutionsmiljer eller hemmet och kan kombineras med lokala antiseptika och sekundära förband.

Sestava
Obloga ResposorbSilicone Border je izdelana iz polipropilene poliuretanske zunanje plasti, perforiranega silikonskega filma na strani, ki je obrnjena proti rani, in vopine blazinice iz celuloze in poliestrskih vlaken. Blazinica ima dvojno delovanje, absorpcijo in izhlapevanje. Zaradi plasti je prepustna za zrak, vendar vodoodporna, zato se bolnik lahko prha. Zahvaljujoč perforiranemu silikonskemu filmu, ki je odporen proti vsem, je namenjena obloge enostavnejše. prov taka za se obloga ne spreminja z rano. Vopina blazinica iz celuloze in celuloze in super superabsorbirajoče za vpijanje in zadrževanje eksudata ter je vata s hidrofilno blazinico iz celuloze. Na strani, ki je obrnjena stran od rane, je prevlečena z zelenо hidrofobno netkano plastjo (100-odstotno polipropilen). Izdelek ima na drugi strani zato manj mehko, belo, hidrofilno netkano blazi (viskoza in poliamid).

Lastnosti in delovanje
ResposorbSilicone Border vpije eksudat in ga zadrži v vopni blazinici. Vsebuje mikrookolje, silikonsko stično plast in robove, zato obloge ni treba zavarovati z dodatnim materiali. Zunanja plast je neprepustna za bakterije in vodoodporna proti bakterijam. Menjavo obloge lahko izvedete atraumatično in skoraj brez bolečin.

Namen uporabe
ResposorbSilicone Border je sterilna samolepilna super vopina obloga za enkratno uporabo s silikonsko stično plastjo za upravljanje z ranami z zmerno do močno eksudacijo. Silikonska plast v stiku z ranami omogoča enostavno namestitev in odstranitev brez bolečin in brez poškodb novega epitelija. Vpojna blazinica vpije in zadrži eksudat.

Indikacije
ResposorbSilicone Border je namenjen za obravnavo akutnih in kroničnih ran z zmerno do močno eksudacijo. Silikonska plast, ki je v stiku z rano, omogoča enostavno namestitev in skoraj nebolečo, atraumatsko odstranjevanje obloge. Vpojna blazinica vpije in zadrži eksudat.

Kontraindikacije
Obloge ResposorbSilicone Border ne smejo biti uporabljene pri znanem preobčutljivosti na katero koli njegovo sestavino.

Posebni previdnostni ukrepi
- Zelene vopine blazinice ne obrezujte. Obvezite lahko prosirni rob, da oblogo prilagodite npr. konkavni površini.
- Pred začetkom obdelave ran z visokim tveganjem okužbe se morate povezovati s klinično ukrepanjem, da postavi klinično diagnozo. Zdravljenje z obloge ResposorbSilicone Border je treba začeti pred uporabo tega zavoja za poženje okužene rane. Če so prisotni klinični znaki okužbe, morate okužbo odpraviti z ustreznim zdravljenjem, preden uporabite ta zavoj.
- V vseh primerih upoštevajte uveljavljeni klinični protokol.
- Če imate podatkov glede uporabe te obloge pri določenih skupinah prebivalstva, kot so dojenčki, otroci in nosečе ali doječe ženske, in če nimate podatkov glede kontraindikacij pri teh skupinah prebivalstva, morate to obloge uporabljati previdno in v skladu s pripročili klinične ocenjevalca.
- Na obloge ni dovoljeno stopiti, npr. če so rane prisotne na stopalih.
- Za obloge, ki so pakirane v papirni notranji, sterilni embalaži: zapečateni šiv notranje, sterilne embalaže vsebuje naravni lateks, ki lahko povzroči alergijske reakcije!

Ponovna uporaba medicinskega pripomočka za enkratno uporabo je nevarna. Predelava pripomočkov z namenom, da bi jih ponovno uporabili, lahko resno ogrozi njihovo celovitost in učinkovitost. Informacije so na voljo na zahtevo.

Stranski učinki
Prevelik eksudat, maceracija, povečana bolečina, spremembe obloge z rano, srbenje, peklo, oblozitek, edem, velikzana ulceracija, razтrganine kože, mehurji, eritem. Če se pojavi kateri koli od teh stranskih učinkov, se posvetujte s klinični strokovnjakom.

Poročanje o zapletih
Za bolnikovposvetovalnotrepžo osebo v Evropski uniji in državah z identično regulativno ureditvijo (Uredba 2017/745/EU o medicinskih pripomočkih): če med uporabo tega pripomočka ali zaradi njegove uporabe pride do resnega zapleta, o tem obvestite proizvajalca in/ali pooblaščenega zastopnika ter pristojni državni organ.

Odstranjevanje izdelka
Za zmanjšanje nevarnosti okužanja okolja ali onesnaževanja okolja morate pri odstranjevanju komponent tega medicinskega pripomočka upoštevati postopke odstranjevanja v skladu z veljavnimi in lokalnimi zakoni, pravili, predpisi in standardi proizvajevalca ovoja. Medicinski pripomoček odvrzite med gospodinjske odpadke.

Datum zadnje revizije besedila: 2020-03-11

SI — PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o. - 1000 Ljubljana

Bruksanvisning

Produktbeskrivning
ResposorbSilicone Border är ett sterilt självhäftande superabsorberande förband med silikonskikt för behandling av akuta och kroniska sår med måttlig till stor exsudatproduktion. Silikonskiktet i kontakt med såret underlättar smärtfritt borttagande utan att traumatisera nybildad vävnad. Den absorberande delen absorberar och håller kvar exsudatet.

Sammansättning
ResposorbSilicone Border innehåller en halvgenomsläpplig polyuretanbaserad bakdukt, en perforerad silikonskiva mot såradan och en absorberande del av bomull och fiberpolyester. Absorptionsförmågan ökas genom att förbandet släpper igenom fukt och luft men är vattentätt, vilket möjliggör att patienten kan duscha. Det perforerade silikonskiktet och den absorberande delen innehåller cellulosa och superabsorberande polymer. Förbandet är latexfritt och innehåller inga ämnen som är klassificerade som miljöfarliga. Det är antiallergiskt och har visat sig vara mycket väl tolererat. Förbandet är mjukt och anpassar sig väl till kroppens konturer och kan användas utan problem mycket mjuk, vit, hydrofil och silkeslen lookas och polyamid).

Egenskaper och verkan
ResposorbSilicone Border absorberar och håller kvar exsudatet i den absorberande delen. Kontaktytor och kanter består av mikrohäftbarriär silikon. Det ökas inget ytterligare material för att sårka förbandet. Tran på baksidan skyddar mot bakterier och tillåter duschning. Förbandsbytena kan göras atraumatiskt och nästan smärtfritt.

Avsedd användning
ResposorbSilicone Border är ett superabsorberande, självhäftande och sterilt engångsförband med silikonskiva för längtidsbehandling av skadad hud, akuta och kroniska sår med måttligt till stora mängder exsudat. Det används enbart på svåra patienter av vårdpersonal i institutionsmiljer eller hemmet och kan kombineras med lokala antiseptika och sekundära förband.

Særlige forholdsregler
- Skær ikke i den absorberende grønne pude. Den transparente grønne kan skæres til for at tilpasse forbindingen, f.eks. til en konkav form.
- Før behandling af et inficeret sår, med lang helingstid, skal en klinisk konsulteres for at få en klinisk diagnose. Behandlingen med ResposorbSilicone Border kan ikke erstatte en kausalbehandling af det, der forårsager helingsforsinkelsen. Hvis der forekommer kliniske tegn på infektion, skal infektionen behandles med hensigtsmæssig behandling, før denne forbindelig kan tages i brug.
- Den etablerede klinisk protokol skal følges under alle omstændigheder.
- Hvis der ikke findes data til støtte for anvendelse af denne forbindelig til følgende grupper som spædbørn, børn, gravide eller ammende kvinder, og hvis der ikke findes data om det medicinske udstyr, skal forbindingen anvendes efter klinikerens anbefalinger.
- Det anbefales at ikke stå på forbindingen, og undgå uncertain forbindingen for fuld kropsvægt, f.eks. ved sår på fødderne.
- For forbindinger, der er pakket i papirindpakninger af papir: Den forseglede sæm på peel-pakningen indeholder naturlig gummilatex, som kan udløse allergiske reaktioner!

Genbrug af medicinsk engangsudstyr er forbudt med fare. Reengoring, ny sterilisering af udstyret med henblik på genbrug kan kompromittere udstyrets integritet og forringe dets ydelse eller sikkerhed. Oplysninger kan rekvireres efter anmodning.

Bivirkninger
Øget eksudat, maceration, flere smerter, vedhæftning til sår, klæbe, brændende fornemmelse, eden, flere macerationer, forværret hud, blære, eksem. Sæg læge, hvis nogen af disse bivirkninger opstår.

Rapportering af hændelser
For patienter/brugere/personer i den Europæiske Union og i lande med identisk regulering (EU-forordning nr. 2017/745/EU om medicinsk udstyr): Hvis der under brug af denne enhed eller som følge af brugen heraf er sket en alvorlig hændelse, skal den bruger eller den dertil udpegede repræsentant og til den nationale myndighed.

Bortskaffelse af produkt
For at reducere risikoen for mulig smittefare eller miljøforurening bør komponenterne i dette medicinske udstyr til engangsbrug bortskaffes i overensstemmelse med procedurer, i henhold til lokale love, regler, bestemmelser og standarder for infektionsforebyggelse. Det medicinske udstyr skal kasseres sammen med husholdningsaffald.

Opdateringsdato: 2020-03-11

NO — PAUL HARTMANN AS - 0278 Oslo

Käyttöohjeet

Tuotteen kuvaus
ResposorbSilicone Border on steriili, itseliimittyvä, silikonisella kosketuspinnalla varustettu erittäin tehokas superimukykyinen sidos, joka on tarkoitettu kohtalaisesti tai runsaasti kuivonten ja alueiden haavojen hoitoon. Haavapuolen silikonikerros mahdollistaa helpon ja kivuttoman sidoksen vaihdon, atraumaattisen irrottamisen. Imukykyinen tyyny imee tehokkaasti ja pitää sen sisällään.

Koostumus
ResposorbSilicone Border koostuu puoliläpäisevästä polyuretaanitaustakalvosta, re'itetystä haavapuolen silikonikalvosta ja imukykyisestä tyynyosasta, jossa on selluloosa- ja superimukykyinen polyakrylaatti. Takakalvo läpäisee ilmaa, mutta ei ole vedenläpäisevä, minkä ansiosta potilas voi käydä suihkussa. Läpäisevä haavapuolen silikonikalvo helpottaa sen asettuja ja ärsäkse sen tuottamatta haavaan. Selluloosasta ja erittäin imukykyisestä superabsorboivasta polymeerista koostuva imukykyinen tyyny pidättää eksudaatin ja on ekäinty hydrofiilisen selluloosakuitukerroksen. Se on pehmeästä hydrofobisesta viheriästä kuitua (100 % polypropyleeni) oleva ulkokerros, jossa on mainoksia varten suunniteltuun puolella puolella tuotteessa on hyvin pehmeä, valkoinen, hydrofiilinen kuitu (viskoosia ja polyamidia).

Ominaisuudet ja toimintatapa
ResposorbSilicone Border imee itseensä erittetä ja pitää se imutyynyn sisällä. Sivu on mikroinfektiosuojattu, silikonikalvo ja reunat, joten sidosta ei tarvitse kiinnittää muita materiaaleja. Takakalvo on bakteerit- ja suihkunkestävä. Side voidaan vaihtaa atraumaattisesti ja lähes kivuttomasti.

Käyttötarkoitus
ResposorbSilicone Border on kertakäyttöinen, steriili, itseliimittyvä, erittäin tehokas imukykyinen, silikonikalvolla kosketuspinnalla varustettu side vuotavien haavojen hoitoon pitkäaikaiseen hoitoon ja kivuttomaan haavoissa, jossa haavapuolen silikonikerros helpottaa kohtuullisesti ja runsaasti. Tervejhdenpuolen atmaattisesti voivat käytöstä sidettä vain aikuisille kliinisessä laitos- tai kotihoitoympäristössä sekä voidaan käyttää yhdessä paikallisten antiseptisten aineiden sekä ensisijaisten ja toissijaisten sitoiden kanssa.

Käyttöaiheet
ResposorbSilicone Border soveltuu kohtalaisesti tai runsaasti erittävien akuuttien (palovammat, leikkaushaavat, traumaperäiset haavat) ja kroonisten (säärihaavat, painehaavat, diabeettiset jalkahaavat) haavojen hoitoon.

Sidoksen asettaminen
- Puhdista haava fysiologisella liuoksella tai muilla hoitovaihtoehdoilla.
- Valitse haavaa sopivan kokoinen side. Side on sopivan kokoinen, kun sen keskiryhmä ylittää haavan 1–2 cm:n kaavan reunojen yli joka puolella. Älä leikkaa imukykyistä aktiivihiilisidosta. Läpinäkyvät reunat voidaan leikata sidoksen mukautumiseksi esimerkiksi kaarevaan muotoon.
- Varmista haavan huuhtelemisen jälkeen, ennen sidoksen asettamista, että haavaa ympäröivä iho on kuiva. Leikkaa tarvittaessa ympäröivä karvoitus.
- Poista kalvo suojapaperista. Aseta sitten liimapuoli haavaan päälle niin, että reunat pysyvät osoittaa ylöspäin.
- Paina reunat huolellisesti alaspäin ja vältä ryppyjen muodostumista, jotta side pysyy varmasti paikallaan.
- Lisäkiinnitystä ei tarvita, mutta kompressiosidosta voidaan käyttää lääkärin ohjeen mukaan.
- Sidettä voidaan pitää haavan päällä enintään viisi päivää haavan tilan ja tulehduksen vaiko-yhdistelmän mukaan.
- Side on vaihdettava, jos sitä on kiinnitetään indikaatio tai kun erittet saavuttavat imukykyisen tyynyn reunan.

Vasta-aiheet
Älä käytä ResposorbSilicone Border -sidetä, jos potilas on yliherkkä jollekin sen osalle.

Erityiset varotoimet
- Älä leikkaa imukykyistä vihreää tyynyä. Läpinäkyvää reunaa voi leikata siteen mukautettavuutta esimerkiksi kovetaan muotoon.
- Ennen haavan hoitamista tulehtuneen tai suurentuneen riskin ja kyyttävä hoyeaa lääkäriltä, jotka muodostaa kliinisen diagnoosin. ResposorbSilicone Border -sidoksella ei korvaa haavan huuhtelua ja kliinistä hoitoa. Mikäli kuumeisessa on kliinisiä merkkejä infektiosta, infektio on saatava hallintaan sopivalla hoidolla ennen tämän siteen käyttöä.
- Noudata kaikissa tapauksissa laitoksen vakio-ohjeistusta.
- Koska tämän siteen käytöstä kerkitä potilasryhmille, kuten pikkulapsille, lapsille, raskaana oleville tai imettäville naisille, ei tiettoja puolesta eikä vastaan, sidettä tulee käyttää näille ryhmille käytäen suositusta ja erityistä varkaisuutta.
- Suositellaan, että siteen päällä ei seistä, jos haava on esimerkiksi jalkapohjassa.
- Steril, jotka on pakattu suojapaperisiin steriiliin pakkaukseen: kalvopakkauksen sinetistyy sauma sisältää luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita!

Kertakäyttöisen lääkinnällisen laitteen uudelleenkäyttö on vaarallista. Laitteiden käsittely uudelleenkäyttöä varten voi vahingoittaa niiden eheyttä ja toimivuutta huomattavasti. Lisätietoja on saatavilla pyynnöstä.

Haittavaikutukset
Lisääntynyt eksudaatio, maseraatio, lisääntynyt kipu, siteen kiinnittyminen haavaan, kutina, polttava tunne, ödeema, useita haavaumia, ihon repeytyminen, rakkulat, ihottuma, punoitus. Jos jokin näistä haittavaikutuksista ilmenee, ota yhteyttä lääkäriisi.

Tapahtumista ilmoittaminen
Potilaita, käyttäjiä tai kolmas osapuoli Euroopan unionissa ja maissa, joiden lainsäätäntö on samanlainen (asetus 2017/745/EU lääkinnällistä laitteista): jos tämän laitteen käytön aikana tai seurauksena ilmenee vakava haittatapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle jotta sen valtuutettua edustajalle ja toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle.

Tuotteen hävittäminen
Jotta mahdollisten infektioiden tai ympäristön saastumisen riskit voidaan minimoida, lääkinnällisen laitteen hävittämisen osien osalta on noudatettava sovellettavien ja paikallisten lakien, määräysten, ohjeiden ja infektioiden ehkäisystandardien mukaista toimenpidettä. Hävitä lääkinnällinen laite tavallisesti.

Tekstin muuttumispäivämäärä: 2020-03-11

FI — Oy Paul Hartmann Ab

Bruksanvisning

Produktbeskrivelse
ResposorbSilicone Border er en steril, selvklebende ekstra sterk sugekompress med en kontaktflate av silikon til behandling av kroniske og akutte sår som avgir moderat til stor mengde eksudat. Silikonlaget som er i kontakt med såret, gjør at det er lett å fjerne uten smerte. Sugekompressen absorberer og holder tilbake sårvæsken.

Sammensetning
ResposorbSilicone Border består av en delvis gjennomtrengelig film med yttertlag i polyuretan, en perforert silikonfilm som vender mot såret og en absorberende kjerne av bomull og polyesterfiber. Takket være absorpsjonsevnen og fordi bandasjen slipper gjennom luft og fuktighet, men er vanntett, kan pasienten dusje med bandasjen på. Den perforerte silikonfilmen som er vendt mot såret, gjør det lettere å sette sugekompressen på, og bidrar til at den ikke fester seg til såret. Den absorberende kjernen består av cellulose og superabsorbert polyakrylat som skal absorbere og holde tilbake såvæske og er impregnert av hydrofil cellulose. Den grønne siden av sugekompressen består av et ikke-vevet lag (100 % polypropylen) for å indikere siden vendt bort fra såret. På den andre siden har produktet en hvit, myk, hydrofil kjerne av bomull (viskose og polyamid).

Egenskaper og virkemåte
ResposorbSilicone Border absorberer såvæske og holder den tilbake i den absorberende puten. Den har en mikro-hefftende kontaktflate i silikon og kanter, som gjør at det ikke trengs noe ekstra materiale for å feste sugekompressen til huden. Baksiden beskytter mot bakterier og tillater dusjing. Forbindingsskiftene kan gjøres atraumatisk og nesten smertefritt.

Tiltenkt formål
ResposorbSilicone Border er et sterilt, selvklebende ekstra sterk sugekompress til engangsbruk, med en kontaktflate av silikon, for behandling av sår som avgir moderate til store mengder eksudat. Det skal kun brukes av pasienter i institusjoner eller hjemme av helsepersonell. Kirurgiske miljøer eller hjemmemiljøer, og kan kombineres med lokale antiseptiske midler og sekundære bandasjer.

Indikasjoner
ResposorbSilicone Border egner seg til behandling av sår med moderate til høye nivåer av såravsøk, akutte sår (brannsår, postoperative sår, traumatiske sår) og kronisk sår (venesår, diabetessår, trykksår).

Brukervei ledning
- Rengjør såret med fysiologisk saltløsning eller i samsvar med institusjonens fra legen.
- Velg en egnet sugekompressstørrelse slik at den dekker såret med en kant på ca. 1-2 cm av det sårets kanter. Ikke kjør gjennom det gjennomsiktige laminatet kan skjæres for å tilpasse sugekompressen, f.eks. til en konkav form.
- Før du setter sugekompressen på, etter at såret er skylt, må du påse at huden rundt såret er tørr ved bruk av vattpinner, for å sikre at sugekompressen sitter fast.
- Fjern de to beskyttelsesarkene. Sett sugekompressen på slik at den grønne siden vender bort fra såret.
- Trykk godt ned på kantene, spesielt ved hjørnene, for å sikre at sugekompressen holder seg på plass.
- Ingen ytterligere festing er nødvendig, men kompressbandasje kan brukes i samsvar med institusjonens fra legen.
- Sugekompressen kan stå på såret i opptil 5 dager, avhengig av sårets tilstand og fastsatt klinisk protokoll.
- Sugekompressen må byttes hvis det er klinisk indisert, eller når sårvæsken når frem til kanten av den absorberende puten.

Kontraindikasjoner
ResposorbSilicone Border skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet overfor noen av komponentene.

Spesielle forholdsregler
- Ikke skjær den absorberende grønne puten. Den gjennomskinnelige kanten kan skjæres for å tilpasse sugekompressen, f.eks. til en konkav form.
- Før behandling av et sår med redusert helbredelse, må du vårdere dog med leger for å stille en klinisk diagnose. Behandlingen med ResposorbSilicone Border kan ikke erstatte en kausalbehandling av det, der forårsaker helbredelsesforsinkelsen. Hvis det forekommer kliniske tegn på infeksjon, skal infeksjonen behandles med hensiktsmessig behandling, før denne forbindelig kan tages i bruk.
- Den etablerede klinisk protokol skal følges under alle omstændigheder.
- Hvis der ikke findes data til støtte for anvendelse af denne forbindelig til følgende grupper som spædbørn, børn, gravide eller ammende kvinder, og hvis der ikke findes data om det medicinske udstyr, skal forbindingen anvendes efter klinikerens anbefalinger.
- Det anbefales at ikke stå på forbindingen, og undgå uncertain forbindingen for fuld kropsvægt, f.eks. ved sår på fødderne.
- For forbindinger, der er pakket i papirindpakninger af papir: Den forseglede sæm på peel-pakningen indeholder naturlig gummilatex, som kan udløse allergiske reaktioner!

Genbrug af medicinsk engangsudstyr er forbudt med fare. Reengoring, ny sterilisering af udstyret med henblik på genbrug kan kompromittere udstyrets integritet og forringe dets ydelse eller sikkerhed. Oplysninger kan rekvireres efter anmodning.

Bivirkninger
Øget eksudat, maceration, flere smerter, vedhæftning til sår, klæbe, brændende fornemmelse, eden, flere macerationer, forværret hud, blære, eksem. Sæg læge, hvis nogen af disse bivirkninger opstår.

Rapportering af hændelser
For patienter/brugere/personer i den Europæiske Union og i lande med identisk regulering (EU-forordning nr. 2017/745/EU om medicinsk udstyr): Hvis der under brug af denne enhed eller som følge af brugen heraf er sket en alvorlig hændelse, skal den bruger eller den dertil udpegede repræsentant og til den nationale myndighed.

Bortskaffelse af produkt
Med henblik på at reducere risikoen for mulig smittefare eller miljøforurening bør komponenterne i dette medicinske udstyr til engangsbrug bortskaffes i overensstemmelse med procedurer, i henhold til lokale love, regler, bestemmelser og standarder for infektionsforebyggelse. Det medicinske udstyr skal kasseres sammen med husholdningsaffald.

Opdateringsdato: 2020-03-11

NO — PAUL HARTMANN AS - 0278 Oslo

استخدام التعليمات

وصف المنتج
ResposorbSilicone Border هو ضماد معقم ذاتي اللاصق وشديد الامتصاص ذات طبقة تلامس السيليكون لعلاج الجروح الحادة والمزمنة متوسطة أو عالية الإفراز. تسمح الطبقة السيليكونية الموجودة على سطح الجرح بإزالة الضماد بدون ألم دون إحداث أضرار للأنسجة الجديدة. تحتفظ الطبقة الماصة بالإفراز. الغشاء شبه النفاذ مقاوم للبكتيريا والماء. يمكن تغيير الضماد بأمان وبدون ألم تقريبًا.

التركيب
تتكون ضمادة ResposorbSilicone Border من غشاء بولي يوريثان خلفي شبه نفاذ للهواء، وطبقة سيليكون مثقبة على الجانب المواجه للجرح، وطبقة ماصة بين الطبقتين. تزيد المسامات الأصلي الهوائي طبقة الطبقات معًا، بينما الغشاء الخلفي يقاوم البكتيريا والماء، مما يسمح بالاستحمام. لا تحتوي ضمادة ResposorbSilicone Border على مواد لاصق