DE Gebrauchsanleitung

Produktbeschreibung
HydroTac transparent/-comfort ist ein transparenter Hydrogelverband aus einem saugfähigen Polyurethan-Polyfreisetoff-Hybrid-Polymer, der Propylenglykol enthält. Die Rückseite besteht aus einem gasdurchlässigen, flüssigkeits- und keimdichten Deckfilm aus Polyurethan.

HydroTac transparent comfort verfügt zusätzlich über einen umlaufenden, selbsthaftenden Kleberand, der mit einem Polyacrylatkleber beschichtet ist.

Eigenschaften und Wirkungsweise
HydroTac transparent/-comfort kann sowohl Feuchtigkeit abgeben als auch in begrenztem Maße Sekret aufnehmen. Hierdurch stellt sich in jedem Falle ein feuchtes Wundmilieu, welches heilungsfördernd ist, zur Verfügung wird. HydroTac transparent/-comfort ist transparent und haftet nicht an der Wunde.

Durch diese Eigenschaften ist eine Wundinspektion jederzeit ohne Verbandswechsel möglich.

Da HydroTac transparent comfort über einen hauftreundlichen, umlaufenden Kleberand verfügt, sind hier zusätzlichen Materialien für die Verbandfixierung notwendig.

Verwendungszweck / Indikationen
HydroTac transparent/-comfort eignet sich für die Behandlung von Wunden in der Granulations- und Epithelisierungsphase mit keiner bis geringer Exsudatmenge.

HydroTac transparent/-comfort ist für die Verwendung durch professionelle Anwender vorgesehen. Wundbehandlungsfachkräfte können den Verbandwechsel an Patienten und/oder familienangehörige delegieren (Durchführung durch Laien unter Leitung von Fachkräften).

Anwendungshinweise
HydroTac transparent/-comfort in der Größe so wählen, dass das Wundkissen die Wundränder ca. 1–2 cm überragt. Der Verband HydroTac transparent kann bei Bedarf mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden.

Die umliegende Haut sollte trocken sein, bevor HydroTac transparent/-comfort mit umlaufenden Kleberand angebracht wird.

HydroTac transparent/-comfort: Remove the white protective foil following the numbering (1 & 2) abziehen. HydroTac transparent auf die Wunde legen und mit geeigneten Materialien fixieren.

HydroTac transparent/-comfort: Die weiße Schutzfolie entsprechend der Nummerierung (1 & 2) abziehen, den Verband auf die Wunde legen und den Kleberand gut andrücken. Dann die Deckfolie entsprechend der Nummerierung (3 & 4) abziehen.

HydroTac transparent/-comfort kann bis zu sieben Tage auf der Wunde verbleiben. Die Aufnahme von Exsudat ist an der Trübung und/oder Blasenbildung des Verbands zu erkennen. HydroTac transparent/-comfort sollte ausgetauscht werden, sobald die Blase in etwa die Abmessungen des Wundbereichs hat. HydroTac transparent/-comfort zum Verbandwechsel an einer Ecke leicht lösen und vorsichtig abziehen.

Kontraindikationen
HydroTac transparent/-comfort nicht bei Patienten mit einer Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile anwenden. Nicht anwenden, wenn eine klinische Infektion vorliegt, desgleichen bei Brandwunden 3. Grades.

Mögliche Nebenwirkungen
Wie jedes anderen Medizinprodukt kann auch dieses Produkt Nebenwirkungen haben, die nicht bei jedem Patienten auftreten müssen.

Allgemeine Nebenwirkungen von HydroTac transparent/-comfort:
- In seltenen Fällen kann HydroTac transparent/-comfort eine lokale Reaktion (Reizung, Hautrötungen wie z. B. Rötung, Schwellung) hervorrufen.
- In seltenen Fällen kann HydroTac transparent/-comfort eine allergische Reaktion hervorrufen.

Treten bei Ihren Nebenwirkungen auftreten, die hier nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen
Die Heilung der Behandlung von Wunden mit beeinträchtigter Hirndurchblutung ist eine ärztliche Beurteilung des Wundzustandes und der Ursachen der Wundheilungsstörungen notwendig.

Die Behandlung mit HydroTac transparent/-comfort kann eine Kausalbehandlung der Wundheilungsstörungen nicht ersetzen.

Die Verwendung von HydroTac transparent/-comfort bei Kindern unter 5 Jahren, Schwangeren und Stillenden wurde nicht untersucht. Der behandelnde Arzt bzw. die Wundbehandlungsfachkräfte sollten Vorsicht walten lassen.

Allgemeine Hinweise
Bei Temperaturen zwischen 5–40 °C aufbewahren. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Stand der Information: 2018-05

Nur zum Einmalgebrauch
Nicht erneut sterilisieren
Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
Trocken aufbewahren

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 HEIDENHEIM, GERMANY

0123

AT – PAUL HARTMANN Ges.m.b.H. - 2355 Wiener Neudorf
CH – IVF HARTMANN AG - 8212 Neuhausen

AU – PAUL HARTMANN Pty. Ltd. - Macquarie Park, NSW 2113
GB – PAUL HARTMANN Ltd. - Heywood/Greater Manchester OL10 2TT
ZA – HARTMANN South Africa - Northriding, 2169

EN Instructions for use

Product description
HydroTac transparent/-comfort is a transparent hydrogel dressing consisting of an absorbent polyurethane-polyurea hybrid polymer which contains propylene glycol. The backing consists of a gas-permeable polyurethane film which is impermeable to liquids and bacteria.

In addition, HydroTac transparent comfort has an adhesive border, which is coated with polyacrylate adhesive.

Properties and mode of action
HydroTac transparent/-comfort can release moisture and absorb a limited amount of exudate. This provides a moist wound environment which has a stimulating effect on wound healing. HydroTac transparent/-comfort is transparent and may not stick to the wound.

Because of these characteristics, wound inspection is possible at any time without a change of dressing.

As HydroTac transparent comfort has a skin-friendly adhesive film border, no other materials are needed to secure the dressing.

Intended use / Indications
HydroTac transparent/-comfort is suitable for the treatment of dry or lightly exuding wounds in the granulation and epithelialization stages.

HydroTac transparent/-comfort is intended to be applied by professional users. Wound care professionals may delegate dressing changes to patients and/or their relatives (non-professionals under supervision of professionals).

Mode of application
Select a size of HydroTac transparent/-comfort so that the wound pad overlaps the margins of the wound by approx. 1–2 cm. HydroTac transparent may be cut to size with sterile scissors if required.

Surrounding skin should be dry before applying the wound dressing HydroTac transparent/-comfort with adhesive border.

HydroTac transparent: Remove the white protective foil following the numbering (1 & 2). Place HydroTac transparent on the wound and secure with suitable secondary dressing material.

HydroTac transparent/-comfort: Remove the white protective foil following the numbering (1 & 2), place the dressing on the wound and press down the adhesive edges firmly. Remove the protective top layer following the numbering (3 & 4).

HydroTac transparent/-comfort can be left on wounds up to seven days. Absorption of exudate is apparent as clouding and/or blistering of the dressing. HydroTac transparent/-comfort should be changed when the blister has approximately reached the dimensions of the wound area. To change the dressing, detach HydroTac transparent/-comfort slightly at one edge and remove it carefully.

Contraindications
Do not use HydroTac transparent/-comfort on patients with an intolerance to any of its ingredients. Do not use on wounds which are clinically infected or on 3rd degree burns.

Possible adverse events
As any other medical device, this product can have side effects, which must not occur for everybody.

General side effects of HydroTac transparent/-comfort:
- In rare cases HydroTac transparent/-comfort might cause local reaction (irritation, skin reactions e.g. redness, swelling)
- In rare cases HydroTac transparent/-comfort might cause allergic reaction

In case you notice any effects not listed here, contact your doctor or pharmacist.

Special precautions
Medical assessment of the condition of the wound and the causes of the delay in wound healing are necessary before treating wounds with impaired healing.

Treatment with HydroTac transparent/-comfort cannot replace treatment of the cause of the impaired healing.

The use of HydroTac transparent/-comfort on children under 5 years, pregnant and breastfeeding women has not been established. Caution should be undertaken by your attending physician or wound care specialists.

General instructions
Store at temperature between 5– 40 °C. Keep out of reach of children.

Date of revision of the text: 2018 -05

Single use only
Do not re-sterilize
Do not use if package is damaged
Keep dry

FR – Lab. PAUL HARTMANN S.A.r.l. - Châtenois - 67607 Sélestat CEDEX
BE – N.V. PAUL HARTMANN S.A. - 1480 Saintes/Sint-Renelde
MA – PAUL HARTMANN S.a.r.l. - 20100 Casablanca

FR Mode d'emploi

Description du produit
HydroTac transparent/-comfort est un pansement gel en plaque composé d'un un absorbent polyurethane-polyurea hybrid polymer absorbant contenant du propylène glycol. Il est recouvert d'un film de polyuréthane qui permet les échanges gazeux tout en restant imperméable aux liquides et aux bactéries.

De plus, HydroTac transparent comfort comporte une bordure adhésive recouverte d'un adhésif polyacrylate.

Propriétés et mode d'action
HydroTac transparent/-comfort peut libérer de l'humidité tout en absorbant une quantité limité d'exsudats. Le milieu humide ainsi entretenu stimule la cicatrisation de la plaie. HydroTac transparent/-comfort est transparent et n'adhère pas à la plaie.

Ces caractéristiques permettent un contrôle visuel de la plaie à tout moment, sans avoir à renouveler le pansement.

Du fait de la nature non agressive pour la peau de la bordure adhésive de HydroTac transparent comfort, aucune fixation complémentaire n'est nécessaire.

Utilisation prévue / Indications
HydroTac transparent/-comfort est indiqué pour le soin des plaies sèches ou faiblement exsudatives à la phase de granulation et la phase de granulation et la phase d'épithélialisation.

HydroTac transparent/-comfort est destiné à être appliqué par des utilisateurs professionnels. Les spécialistes du traitement des plaies peuvent déléguer le changement des pansements aux patients et/ou à leurs proches (non-professionnels sous la supervision de professionnels).

Instructions d'utilisation
Choisir la taille d'HydroTac transparent/-comfort de façon à ce que la compresse dépasse sous les bords de la plaie de 1 à 2 cm. HydroTac transparent peut être recoupé à l'aide de ciseaux stériles.

La peau environnante doit être sèche avant d'appliquer le pansement HydroTac transparent comfort à l'aide de la bordure adhésive.

HydroTac transparent: Retirer le plastique protecteur blanc en respectant la numérotation (1 et 2). Appliquer HydroTac transparent sur la plaie, et le fixer à l'aide d'un produit de fixation approprié.

HydroTac transparent/-comfort: retirer le film protecteur blanc en respectant la numérotation (1 et 2) et appliquer le pansement sur la plaie, en appuyant fermement sur la bordure adhésive. Retirer le film supérieur selon la numérotation (3 et 4).

HydroTac transparent/-comfort peut être laissé sur les plaies jusqu'à sept jours. L'absorption de l'exsudat apparaît comme une opacification et/ou une boursouflure du pansement. HydroTac transparent/-comfort doit être changé lorsque la bourouflure a atteint approximativement les dimensions de la zone de la plaie. Pour changer le pansement HydroTac transparent/-comfort, soulever un angle et tirer avec précaution.

Contre-indications
Ne pas utiliser HydroTac transparent/-comfort chez les patients présentant une intolérance à l'un de ses composants. Ne pas utiliser en présence d'une infection clinique, ni sur des brûlures du 3e degré.

Évènements indésirables possibles
Comme tout autre dispositif médical, ce produit peut avoir des effets secondaires, susceptibles ne pas se produire chez tous les patients.

Effets secondaires généraux de HydroTac transparent/-comfort :
- Dans de rares cas, HydroTac transparent/-comfort peut provoquer une réaction locale (irritation, réactions cutanées, rougeur, gonflement).
- Dans de rares cas, HydroTac transparent/-comfort peut provoquer une réaction allergique.

Si vous remarquez des effets qui ne sont pas énumérés ici, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Précautions particulières
Tout traitement de plaies doit le processus cicatriciel est perturbé doit être précédé d'un examen médical visant à évaluer l'état de la plaie et à déterminer l'origine du retard de cicatrisation.

Le traitement avec HydroTac transparent/-comfort ne remplace pas un traitement étiologique des troubles de la cicatrisation.

L'utilisation de HydroTac transparent/-comfort chez les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes ou qui allaitent n'a pas été établie. Votre médecin traitant ou les spécialistes du traitement des plaies doivent utiliser HydroTac avec précaution.

Indications générales
Conserver entre 5°C et 40°C. Tenir hors de portée des enfants.

Date de dernière révision de la notice : 05-2018

A usage unique
Ne pas stériliser
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
Craint l'humidité

NL – PAUL HARTMANN B.V. - 6546 BC Nijmegen
BE – N.V. PAUL HARTMANN S.A. - 1480 Saintes/Sint-Renelde

NL Gebruiksaanwijzing

Productbeschrijving
HydroTac transparent/-comfort is een transparant hydrogelverband dat bestaat uit een absorberend hydride polyurethane-polyurea copolymeer dat propyleenglycol bevat. De achterkant bestaat uit een waterdampdoorlatende folie van polyurethaan die ondoordringbaar is voor vloeistoffen en bacteriën.

HydroTac transparent comfort beschikt daarnaast ook over een kleefrand, die bedekt is met een hechtmiddel op basis van acryl.

Eigenschappen en werkingswijze
HydroTac transparent/-comfort kan vocht afgeven en een beperkte hoeveelheid wondvocht absorberen. Dit zorgt voor een vochtig wondmilieu, wat een stimulerend effect heeft op de genezing van de wonde. HydroTac transparent/-comfort is transparant en kleeft niet in de wonde.

Dankzij deze eigenschappen van het verband kan de wond op elk gewenst moment worden geïnspecteerd zonder dat het verband hoeft te worden vervangen.

Aangezien HydroTac transparent comfort rondom is voorzien van een huidvriendelijke klevende rand is er geen extra materiaal nodig om het verband te fixeren.

Toepasselijk / Aanwijzingen
HydroTac transparent/-comfort is geschikt voor de behandeling van wonden in de granulatie- en epithelialisatiefase met weinig of geen exsudaat.

HydroTac transparent/-comfort is bedoeld voor gebruik door medische zorgverleners worden aangebracht. Medische zorgverleners kunnen het verwisselen van wondverbanden ook laten uitvoeren door patiënten en/of hun familieleden (niet-deskundigen onder toezicht van deskundigen).

Wijze van aanbrengen
Kies een formaat van de HydroTac transparent/-comfort, zodat het verband ca. 1–2 cm over de rand van de wonde komt. HydroTac transparent kan zo nodig met een steriele schaar op maat worden geknipt.

De omringende huid moet droog zijn voor het wondverband HydroTac transparent comfort met kleefrand wordt aangebracht.

HydroTac transparent: Verwijder de witte beschermfolie in de aangegeven volgorde (1 & 2). Plaats HydroTac transparent op de wonde en fixeer met geschikt materiaal.

HydroTac transparent/-comfort: verwijder de witte beschermfolie in de aangegeven volgorde (1 & 2), leg het verband op de wonde en druk de plakrand goed aan. Verwijder vervolgens de beschermende bovenlaag in de aangegeven volgorde (3 & 4).

HydroTac transparent/-comfort mag maximaal zeven dagen op de wonde blijven zitten. Absorptie van wondvocht is zichtbaar doordat het verband troebel wordt of blaren vertoont. HydroTac transparent/-comfort moet worden vervangen als de blaar ongeveer even groot is als de wonde. Bij het verwijderen van het verband trekt u HydroTac transparent/-comfort aan een hoek iets los en trekt u het voorzichtig van de wonde.

Contra-indicaties
Gebruik HydroTac transparent/-comfort niet bij patiënten die overgevoelig zijn voor een van de bestanddelen ervan. Niet gebruiken bij klinisch geïnfecteerde wonden en derdegraads brandwonden.

Mogelijke bijwerkingen
Net als ieder ander medisch product kan dit product bijwerkingen hebben, die mogelijk niet bij iedereen voorkomen.

Algemene bijwerkingen van HydroTac transparent/-comfort:
- In zeldzame gevallen kan HydroTac transparent/-comfort plaatselijke reacties veroorzaken (zoals irritatie, huidreacties zoals roodheid, zwelling)
- In zeldzame gevallen kan HydroTac transparent/-comfort allergische reacties veroorzaken

Indien u effecten opmerkt die hier niet staan vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Speciale voorzorgsmaatregelen
Voordat wordt begonnen met de behandeling van wonden met een verminderde genezingstendens dient een arts de wond te beoordelen en onderzoek te doen naar de oorzaak van de vertraagde wondgenezing.

De behandeling met HydroTac transparent/-comfort kan de behandeling van de primaire oorzaak van de wondgenezingsstoornis niet vervangen.

Het gebruik van HydroTac transparent/-comfort bij kinderen onder de 5 jaar en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven is niet vastgesteld. De behandelende arts of wondzorgspecialisten dienen voorzichtig te werk te gaan.

Algemene instructies
Bewaren tussen 5 °C en 40 °C. Buiten het bereik van kinderen houden.

Datum van herziening van de tekst: 05-2018.

Uitsluitend voor eenmalig gebruik
Niet opnieuw steriliseren
Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd
Droog bewaren

IT – PAUL HARTMANN S.p.A. - 37139 Verona
CH – IVF HARTMANN AG - 8212 Neuhausen

IT Istruzioni per l'uso

Descrizione del prodotto
HydroTac transparent/-comfort è una medicazione idrocellulare trasparente costituita da un polimero ibrido poliuretano-polisarcosina assorbente che contiene propilenglicole. Il lato posteriore consiste in una pellicola di poliuretano permeabile a gas e impermeabile ai liquidi e ai germi.

HydroTac transparent comfort è dotata inoltre di un bordo autoadesivo che è rivestito da un adesivo poliacrilato.

Proprietà e modo di azione
HydroTac transparent/-comfort è in grado di cedere umidità alla ferita e di assorbire quantitative limitati di essudato. Questo crea un ambiente umido sulla ferita, stimolando il processo di guarigione. HydroTac transparent/-comfort è transparente e non aderisce alla ferita.

Grazie a queste caratteristiche, è possibile ispezionare la ferita in ogni momento, senza dover sostituire la medicazione.

Grazie al bordo adesivo che non irrita la pelle, HydroTac transparent comfort non necessita di alcun materiale aggiuntivo per il fissaggio della medicazione.

Destinazione d'uso/Indicazioni
HydroTac transparent/-comfort è indicata per il trattamento di ferite nella fase di granulazione e di epitelizzazione con leggera o assente essudazione.

HydroTac transparent/-comfort è destinata all'uso da parte di operatori specializzati. Gli specialisti del trattamento di ferite possono delegare la sostituzione della medicazione ai pazienti e/o ai loro parenti (non professionisti sotto la supervisione di professionisti).

Avvertenze per l'applicazione
Scegliere la dimensione adeguata di HydroTac transparent/-comfort in modo che la medicazione ricopra la ferita estendendosi leggermente oltre i suoi margini di ca. 1 – 2 cm. Se necessario, HydroTac transparent può essere tagliata con forbici sterili.

La pelle circostante deve essere asciutta prima di applicare la medicazione per ferite HydroTac transparent/-comfort con bordo adesivo.

HydroTac transparent: Rimuovere la pellicola protettiva bianca seguendo la numerazione (1 e 2). Posizionare HydroTac transparent con il lato impregnato di gel a contatto con la ferita e fissarla con materiali appropriati.

HydroTac transparent/-comfort: rimuovere la pellicola protettiva bianca seguendo la numerazione (1 e 2), posizionare la medicazione a contatto con la ferita e premere con cura i bordi adesive. Rimuovere lo strato protettivo superiore seguendo la numerazione (3 e 4).

HydroTac transparent/-comfort può rimanere sulla ferita fino a sette giorni. L'assorbimento dell'essudato è evidente così come l'interbimbimento e/o rigonfiamento della medicazione. HydroTac transparent/-comfort deve essere sostituita quando la bolla ha raggiunto approssimativamente le dimensione del'area della ferita. Per sostituire HydroTac transparent/-comfort, sollevare leggermente un bordo adesivo e rimuovere con attenzione la medicazione.

Controindicazioni
Non utilizzare HydroTac transparent/-comfort su pazienti con intolleranza a uno dei suoi ingredienti. Non utilizzare in presenza di infezioni in fase clinica o di ustioni di 3° grado.

Possibili eventi avversi
Come qualsiasi altro dispositivo medico, il prodotto può causare effetti collaterali, i quali non si verificano necessariamente in ogni individuo. Effetti collaterali generici di HydroTac transparent/-comfort:
- In rari casi HydroTac transparent/-comfort può causare reazioni locali (irritazioni e reazioni cutanee, p. es. eritema, gonfiore, ecc.)
- In rari casi HydroTac transparent/-comfort può causare reazioni allergiche

In caso di effetti non elencati qui, contattare il proprio medico o farmacista.

Precauzioni particolari
Qualsiasi trattamento di una ferita con scarsa tendenza alla guarigione deve essere preceduto da un esame medico delle condizioni della ferita e delle cause che determinano la compromissione del suo processo di guarigione.

Il trattamento con HydroTac transparent/-comfort non può sostituirsi al trattamento delle cause che provocano l'alterazione del processo di guarigione.

Non è stato provato l'utilizzo di HydroTac transparent/-comfort su bambini di età inferiore a cinque anni e donne in stato di gravidanza e in fase di allattamento al seno. È necessario esercitare cautela da parte del medico curante o specialista.

Istruzioni generali
Conservare a una temperatura compresa tra 5 °C e 40 °C. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Data di revisione del testo: 05-2018

Monouso
Non risterilizzare
Non utilizzare se l'imballaggio non è integro
Mantenere asciutto

ES – Laboratorios HARTMANN S.A. - 08302 Mataró

ES Instrucciones de uso

Descripción del producto
HydroTac transparent/-comfort es un apósito de hidrogel transparente a base de un polímero absorbente híbrido de poliuretano-poliurea, que contiene propilenglicol. La parte posterior consiste en una película de poliuretano permeable a los gases, pero impermeable a líquidos y bacterias.

Además, HydroTac transparent comfort tiene un borde adhesivo, recubierto de adhesivo de poliacrilato.

Características y principio de acción
HydroTac transparent/-comfort puede humedecer y absorber una cantidad limitada de exsudado. Dede modo proporciona un medio húmedo con efecto estimulador en el proceso de curación de la herida. HydroTac transparent/-comfort es transparente y evita la adherencia a la herida.

Gracias a estas características, permite comprobar la herida en cualquier momento, sin tener que sustituir la medicación.

El apósito HydroTac transparent comfort tiene un borde con adhesivo delicado con la piel, por lo que no necesita nada más para fijarlo con firmeza.

Uso adecuado / Indicaciones
HydroTac transparent/-comfort es adecuado para el tratamiento de heridas secas o con poco exudado, en las fases de granulación y epitelización.

HydroTac transparent/-comfort está destinado al uso por parte de profesionales. El personal especializado en el tratamiento de heridas puede delegar el cambio de apósito a los pacientes o familiares (las personas no profesionales deberán hacerlo con la supervisión de expertos).

Aplicación
Elija un apósito HydroTac transparent/-comfort del tamaño adecuado para que la almohadilla sobresalga de los bordes de la herida de 1 a 2 cm. Puede tener que recortar el apósito HydroTac transparent con unas tijeras esterilizadas.

La piel circundante debe estar seca antes de aplicar el apósito HydroTac transparent comfort con borde adhesivo.

HydroTac transparent: Retire el plástico protector blanco siguiendo la numeración (1 y 2). Coloque el apósito HydroTac transparent sobre la herida e fíjelo con material adicional adecuado.

HydroTac transparent/-comfort: Retire el plástico protector blanco siguiendo la numeración (1 y 2), coloque el apósito con el lado impregnado en gel sobre la herida y presione con firmeza los bordes adhesivos. Retire entonces la lámina protectora segun la numeración (3 y 4).

HydroTac transparent/-comfort puede permanecer na herida asta siete dias. La absorción de exsudado se manifiesta como empañamiento y/o formación de ampollas en el apósito. HydroTac transparent/-comfort debe cambiarse cuando la ampolla tenga el tamaño de la zona de la herida. Para cambiar el apósito, levante el apósito HydroTac transparent/-comfort ligeramente por una esquina y retírelo con cuidado.

Contraindicaciones
HydroTac transparent/-comfort no deberá usarse con pacientes con tengan alguna intolerancia a cualquiera de sus componentes. No utilice este apósito sobre heridas con infección clínica o en quemaduras de tercer grado.

Posibles eventos adversos
Como sucede con cualquier otro producto sanitario, este producto puede tener efectos secundarios, que no todos tienen por qué darse en todas las personas.

Efectos secundarios generales de HydroTac transparent/-comfort:
- En casos raros, os persons HydroTac transparent/-comfort podem causar reações locais (irritação, reações cutâneas, p. ex. vermelhidão, inchaço).
- Em casos raros, os persons HydroTac transparent/-comfort podem causar reações alérgicas.

Se observan efectos no indicados aquí, consulte o seu médico ou farmacéutico.

Precauções especiais
Antes de cada tratamento de feridas de difícil cicatrização, é necessária uma avaliação médica da situação da ferida e das causas da dificuldade de cicatrização.

O tratamento com HydroTac transparent/-comfort não substitui o tratamento da causa de uma cicatrização comprometida da ferida.

A utilização de HydroTac transparent/-comfort em crianças menores de 5 anos, mulheres grávidas ou a amamentar não foi comprovada. O seu médico assistente ou especialista em tratamento de feridas deverá usá-lo com precaução.

Instruções gerais
Conservar entre 5 °C e 40 °C. Manter fora do alcance das crianças.

Data de revisão do texto: 05/2018

Apenas para utilização única
Não resterilizar
Não utilizar caso a embalagem se encontre danificada
Manter seco

PT – PAUL HARTMANN LDA - 2685-378 Prior Velho

PT Instruções de utilização

Descrição do produto
O HydroTac transparent/-comfort é um penso de hidrogel transparente composto por um polímero de poliuretano-poliureia híbrido absorvente que contém propilenoglicol. O penso HydroTac é revestido por uma película de poliuretano permeável a gases e impermeável a líquidos e bactérias.

Adicionalmente, o HydroTac transparent comfort contém um rebordo adesivo revestido com cola de poliacrilato.

Propriedades e modo de atuação
O HydroTac transparent/-comfort produz humidade e absorve uma quantidade limitada de exsudado. Deste modo, cria-se um ambiente húmido, que estimula a cicatrização da ferida. O HydroTac transparent/-comfort é transparente e não se cola à ferida.

Devido a estas características, permite a inspeção da ferida sem remoção do penso.

O HydroTac transparent comfort contém rebordos adesivos hipoalergénicos, não sendo necessário nenhum material extra para fixação do penso.

Utilização prevista / Indicações
O HydroTac transparent/-comfort é adequado para o tratamento de feridas na fase de granulação e de epitelização, sem ou com exsudado moderado.

O penso HydroTac transparent/-comfort destina-se a ser utilizado por profissionais de saúde. Estes poderão delegar a mudança do penso aos pacientes e/ou familiares (sob supervisão adequada).

Modo de aplicação
Escolher o tamanho do penso HydroTac transparent/-comfort, de forma que este cubra parcialmente as margens da ferida em cerca de 1–2 cm. O penso HydroTac transparent pode ser cortado, se necessário, com uma tesoura esterilizada.

A pele circundante deve estar seca antes de aplicar o penso HydroTac transparent comfort com rebordo adesivo.

HydroTac transparent: Retire a película de proteção branca de acordo com a numeração (1 e 2). Colocar o penso HydroTac transparent sobre a ferida e fixá-lo com material adicional adequado.

HydroTac transparent/-comfort: retirar a película de proteção branca de acordo com a numeração (1 e 2) e colocar o penso sobre a ferida, pressionando bem a margem adesiva. Retirar a cobertura superior de acordo com a numeração (3 e 4).

O penso HydroTac transparent/-comfort pode permanecer na ferida até sete dias. A absorção de exsudado é visível através da turvação e/ou empolamento do penso. O penso HydroTac transparent/-comfort deve ser mudado quando o empolamento tiver alcançado aproximadamente as dimensões da área da ferida. Para a mudança do penso, descolar o HydroTac transparent/-comfort num dos cantos e remover cuidadosamente.

Contraindicações
HydroTac transparent/-comfort não deverá ser utilizado em pacientes com intolerância a qualquer um dos seus componentes. Não utilizar em feridas com infecção clínica ou em queimaduras de terceiro grau.

Possíveis efeitos adversos
Tal como qualquer outro dispositivo médico, este produto pode ter efeitos secundários, os quais podem não ocorrer em todos os utilizadores.

Efeitos secundários gerais do HydroTac transparent/-comfort:
- Em casos raros, os persons HydroTac transparent/-comfort podem causar reações locais (irritação, reações cutâneas, p. ex. vermelhidão, inchaço).
- Em casos raros, os persons HydroTac transparent/-comfort podem causar reações alérgicas.

Se observar efeitos não indicados aqui, consulte o seu médico ou farmacêutico.

Precauções especiais
Antes de cada tratamento de feridas de difícil cicatrização, é necessária uma avaliação médica da situação da ferida e das causas da dificuldade de cicatrização.

O tratamento com HydroTac transparent/-comfort não substitui o tratamento da causa de uma cicatrização comprometida da ferida.

A utilização de HydroTac transparent/-comfort em crianças menores de 5 anos, mulheres grávidas ou a amamentar não foi comprovada. O seu médico assistente ou especialista em tratamento de feridas deverá usá-lo com precaução.

Instruções gerais
Conservar entre 5 °C e 40 °C. Manter fora do alcance das crianças.

Data de revisão do texto: 05/2018

Apenas para utilização única
Não resterilizar
Não utilizar se a embalagem estiver danificada
Manter seco

GR – PAUL HARTMANN HELLAS S.A. - 19400 Glytada/Athina

GR Οδηγίες χρήσης

Περιγραφή προϊόντος
Το HydroTac transparent/-comfort είναι ένα διάφανο επίθεμα υδρογέλης που αποτελείται από απορροφητικό πολυουρεθάνο-πολυουρία πολυμερές πολυμερές το οποίο περιέχει προπυλενογλυκόλη. Η πίσω πλευρά αποτελείται από διαπερατή στα αέρια, αδιάβροχες και αποβλήτητο για μικρόβια φιλμ πολυουρεθάνης.

Το επίθεμα HydroTac transparent comfort διαθέτει επιπλέον αυτοκόλλητο άκρο το οποία είναι επιστρωμένο με κόλλα ακρυλικές βάσης.

Ιδιότητες και τρόπος δράσης
Το HydroTac transparent/-comfort είναι σε θέση να μεταδώσει υγρασία στην πληγή αλλά και να απορροφήσει τα υγρά της. Το υγρό περιβάλλον που δημιουργείται κατά αυτόν τον τρόπο ευνοεί την επούλωση της πληγής από τους ιστούς. Το HydroTac transparent/-comfort είναι διάφανο και προσφέρει τη δυνατότητα οπτικοποίησης αλλιώς του επιθέματος.

Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά είναι δυνατός οποιαδήποτε στιγμή ο έλεγχος της πληγής χωρίς αλλαγή επιθέματος.

Το HydroTac transparent comfort διαθέτει επιπλέον περιμετρικά μια αυτοκόλλητη ταινία που δεν προκαλεί ερεθισμούς, έτσι ώστε να μην χρειάζεται πρόσθετο υλικό για τη στερέωση του.

Προβλεπόμενη χρήση / Ενδείξεις
Το HydroTac transparent/-comfort ενδείκνυται για τη θεραπεία τραυμάτων με ελάχιστες ή χωρίς καθόλου εκκρίσεις στη φάση της κοκκοποίησης και της σχηματισης του επιθηλιακού ιστού.

Το επίθεμα HydroTac transparent/-comfort προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες χρήστες. Οι επαγγελματίες φροντίδας τραυμάτων μπορούν να ανεθέσουν τις αλλαγές του επιθέματος στους ασθενείς και/ή τους συγγενείς τους (μη επαγγελματίες από την καθοδήγηση επαγγελματιών).

Οδηγίες εφαρμογής
Επιλέξτε το μέγεθος του επιθέματος HydroTac transparent/-comfort έτσι ώστε να υπερκαλύπτει τα άκρα της πληγής κατά περίπου 1–2 cm. Εάν χρειάζεται, κόψτε το επίθεμα HydroTac transparent με αποστειρωμένο ψαλίδι.

Το περιβάλλον δέρμα θα πρέπει να είναι στεγνό πριν από την εφαρμογή του επιθέματος HydroTac transparent/-comfort με αυτοκολλητη περίμετρο.

HydroTac transparent: Αφαιρέστε το λευκό προστατευτικό μεμβράνη σύμφωνα με την αρίθμηση (1 & 2). Τοποθετήστε το HydroTac transparent επάνω στο τραύμα και στερεώστε το με τη χρήση των κατάλληλων υλικών για δεύτερη κάλυψη.

HydroTac transparent comfort: Αφαιρέστε το λευκό προστατευτικό μεμβράνη σύμφωνα με την αρίθμηση (1 & 2), τοποθετήστε το επίθεμα πάνω στο τραύμα και πιέστε καλά τα αυτοκόλλητα άκρα. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την καλυπτική μεμβράνη σύμφωνα με την αρίθμηση (3 & 4).

Το HydroTac transparent/-comfort μπορεί να παραμείνει επάνω στην πληγή για έως και επτά ημέρες. Η απορρόφηση του εξιδρώματος εμφανίζεται ως θόλωση και/ή στο φούσκωμα του επιθέματος. Πρέπει να αλλάξετε το HydroTac transparent/-comfort αν η φουσκάλα έχει σχεδόν φτάσει στα όρια της περιοχής του τραύματος. Για την αλλαγή του HydroTac transparent/-comfort αποκολλήστε τη μία του άκρη και τραβήξτε το με προσοχή.

Αντενδείξεις
Δεν εφαρμόστε η χρήση του HydroTac transparent/-comfort σε άτομα που παρουσιάζουν υπερευαισθησία σε κάποιο από τα συστατικά του. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κλινικής μόλυνσης ούτε σε εγκαύματα 3ου βαθμού.

Πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα
Όπως κάθε άλλο ιατροτεχνολογικό προϊόν, αυτό το προϊόν μπορεί να έχει παρενέργειες οι οποίες δεν εμφανίζονται σε όλους τους ασθενείς.

Γενικές παρενέργειες του HydroTac transparent/-comfort:
- Σε σπάνιες περιπτώσεις, το HydroTac transparent/-comfort μπορεί να προκαλέσει τοπική αντίδραση (ερεθισμός, δερματικές αντιδράσεις π.χ. ερυθρότητα, οίδημα)
- Σε σπάνιες περιπτώσεις, το HydroTac transparent/-comfort μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις

Σε περίπτωση που παρουσιάσετε ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν περιλαμβάνονται εδώ, επισκεφτείτε με τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ειδικές προφυλάξεις
Πριν από την αντιμετώπιση τραυμάτων με καθυστερημένη επούλωση, απαιτείται εκτίμηση της κατάστασης του τραύματος και των αιτιών της καθυστερημένης επούλωσης από τον ιατρό.

Η χρήση του HydroTac transparent/-comfort σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών, καθώς επίσης σε έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες, δεν έχει αξιολογηθεί. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από τον θεράποντα ιατρό σας ή από τους ειδικούς φροντίδας τραυμάτων.

Γενικές οδηγίες
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 5–40 °C. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Ημερομηνία ανεθεώρησης του κειμένου: 05-2018

Μία χρήση μόνο
Μην επαναποστειρώνετε
Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη
Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος

CZ – HARTMANN-RICO a.s. - 66471 Veverská Bítýška

CZ Návod k použití

Popis výrobku
HydroTac transparent/-comfort je transparentní hydrogelové krytí skládající se z absorpčního hybridního polymeru polyuretan-polymočoviny, který obsahuje propylenglykol. Nosná vrstva se skládá z polyuretanové fólie, která je propustná pro plyny a neprostupná pro kapaliny a bakterie.

Varianta HydroTac transparent comfort má navíc lepicí okraj, který je pokrytý vrstvou polyakrylátového lepidla.

Vlastnosti a způsob účinku
Krytí HydroTac transparent/-comfort může uvolňovat vlhkost do okolí a zároveň z něj v omezenosti míře pojmout exsudát. Tím se prostředí rány vhodí a má tu stimulující účinek na hojení rány. HydroTac transparent/-comfort je transparentní a nelepí se na ránu.

Díky těmto vlastnostem je kdykoli možná kontrola rány, aniž by bylo třeba vyměňovat krytí.

Krytí HydroTac transparent comfort má lepicí okraj fólie, který je šetrný vůči pokožce, takže k upevnění krytí nejsou třeba žádné jiné materiály.

Zamýšlené použití / Indikace
Krytí HydroTac transparent

HydroTac transparent

COMFORT

- Hydrogelverband
- Hydrogel dressing
- Pansement gel en plaque
- Hydrogel wondverband
- Medicazione in idrogel
- Apósito de hidrogel
- Penso de hidrogel
- Επίθεμα υδρογειτνίαζης γέλης
- Hydrogelové krytí
- Hydrogélové krytie
- Opatrunek hydrożelowy
- Hidrogél kötszer
- Гидрогелевая повязка
- Hydrogelförband
- 水凝膠敷料
- ضمادة بالهلام المائي
- Хидрогелна превој

PL – PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. • 95-200 Pabianice

HU – HARTMANN-RICO Hungária Kft. • 2051 Biatorbágy, Budapark

RU – PAUL HARTMANN OOO • 115114 Moskwa

SE – HARTMANN-ScandiCare AB • 33421 Anderstorp
NO – PAUL HARTMANN AS • 0278 Oslo

CN – PAUL HARTMANN (Shanghai) Trade Co., Ltd.
Shanghai 200233, P.R. China
HK – PAUL HARTMANN Asia-Pacific Ltd. • Hong Kong

AE – PAUL HARTMANN Middle East FZE • Dubai, U.A.E.
DZ – ص.ب 16 الرويبة – الجزائر

002 2443 (2107/8)

PL Wskazówki stosowania

Opis produktu
HydroTac transparent/-comfort jest przezroczystym opatrunkiem hydrożelowym z chłonnego hydrofobowego poliuretanu polimerowego, który zawiera glikol propylenowy. Spodnia strona składa się z przepuszczalnej dla gazów oraz nieprzepuszczalnej dla płynów i bakterii warstwy poliuretanu.

Opatrunek HydroTac transparent comfort dodatkowo posiada na brzegach warstwę samoprzylepną pokrytą klejem polakrylanowym.

Właściwości i sposób działania
Opatrunek HydroTac transparent/-comfort może oddawać wilgoć i wchłaniać w ograniczonym stopniu wydzielinę z rany. Zawarta w opatrunku w obrębie rany wilgotnego środowiska glikolowego stymulująco na gojenie się rany. Opatrunek HydroTac transparent/-comfort jest przezroczysty i nie przywiera do rany.

Dzięki tym właściwościom możliwa jest kontrola rany w dowolnym czasie bez potrzeby zmiany opatrunku.

Nieprzepuszczalny opatrunek HydroTac transparent comfort posiada na obrzeżu przylgnia dla skóry taśmę klejącą, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych materiałów unieruchamiających opatrunek.

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem/wskazania
Opatrunek HydroTac transparent nadaje się do leczenia ran w fazie ziarninowania i epitelizacji bez wydzieliny lub przy niewielkiej wydzielinie z rany.

Opatrunek HydroTac transparent/-comfort przeznaczony jest do pielęgnowania przez personel medyczny. Specjalisci leczenia ran mogą zlecić zmiany opatrunków pacjentom Vlub ich krewnym (osobom bez przygotowania zawodowego pod nadzorem specjalistów).

Wskazówki stosowania
Należy wybrać taką wielkość opatrunku HydroTac transparent/-comfort, by wystawał on o 1–2 cm poza brzegi rany. W razie potrzeby opatrunek HydroTac transparent można przyciąć, używając wyjałowionych nożyczek.
Przed nałożeniem opatrunku HydroTac transparent/-comfort posiadającego na obrzeżu taśmę klejącą należy upewnić się, że otaczająca skóra jest sucha.
Opatrunek HydroTac transparent/-comfort należy folię ochronną zgodnie z numeracją (1 i 2). Przykryć opatrunek HydroTac transparent do rany i zamocować za pomocą odpowiednich materiałów opatrunkowych.
Opatrunek HydroTac transparent/-comfort pozostawić na ranach do siedmiu dni. W/chłanianie wydzieliny jest widoczne jako zmętnienie Vlub tworzenie się pęcherzy na opatrunku. Opatrunek HydroTac transparent/-comfort powinien być zmieniany mniej więcej wtedy, gdy pęcherze osiągną wymiary obszaru rany. W celu zmiany opatrunku HydroTac transparent/-comfort należy delikatnie odewrzeć jeden róg i ostrożnie zdjąć opatrunek.

Przeciwwskazania
Opatrunku HydroTac transparent/-comfort nie należy stosować u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Nie należy stosować na ranach zakażonych klinicznie oraz na ranach oparzeniowych 3. stopnia.

Możliwe zdarzenia niepożądane
Jak każdy wyrób medyczny ten produkt może powodować działania niepożądane, które nie muszą wystąpić u każdej osoby.
Ogólne działania niepożądane związane z opatrunkiem HydroTac transparent/-comfort:

- W rzadkich przypadkach opatrunek HydroTac transparent/-comfort może powodować wystąpienie reakcji miejscowej (podrażnienia, reakcji skórnej, np. zaczerwienienia, obrzęku).
- W rzadkich przypadkach opatrunek HydroTac transparent/-comfort może spowodować reakcję alergiczną.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych objawów, których tu nie wymieniono, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Szczególne środki ostrożności
Każdorazowo przed przystąpieniem do opatrywania ran trzeba gojących się koniecznia jest dokładna lekarska ocena stanu rany i ustalenie przyczyn zaburzeń w gojeniu się rany.

Opatrywanie rany za pomocą opatrunku HydroTac transparent/-comfort nie może zastąpić przyczynowego leczenia zaburzeń gojenia się rany.

Nie ustalono możliwości stosowania opatrunku HydroTac transparent/-comfort u dzieci w wieku poniżej 5 lat, kobiet w ciąży ani karmiących piersią.
Lekarz prowadzący oraz specjalista w zakresie pielęgnacji ran powinni zachować ostrożność.

Wskazówki ogólne
Przechowywać w temperaturze 5–40°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu: 2018-05

- Wyłącznie do jednorazowego użytku
- Nie sterylizować ponownie
- Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone
- Chronić przed wilgocią

HU Használati útmutató

Termékleírás
A HydroTac transparent/-comfort egy átlátszó gélkötözse, amely propilén-glikolt tartalmazó abszorbens poliuretán-polimer hidrofób polimerből áll. A hátoldal gázt átengedő, de a nedvességnek és a baktériumoknak ellenálló poliuretán fóliaborításból áll.

A HydroTac transparent comfort ezenkívül körbefutó, öntapadó polakrilát ragasztóval bevont ragasztószéllel is rendelkezik.

Tulajdonságai és hatásmechanizmusa
A HydroTac transparent/-comfort egyébiránt képes nedvesség leadására és korlátozott mértékben a sebváladék felvételére is. Az így létrehozott nedves sebmilő a seb gyógyulására ösztönzően hat. A HydroTac transparent/-comfort kötözse átlátszó, és nem ragad bele a sebbe.

Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően a seb megtekintése kötözsecsere nélkül, bármikor elvégezhető.

Mivel a HydroTac transparent comfort borított, öntapadó ragasztó szegéllyel rendelkezik, rúnco szükség további anyagokra a kötözse rögzítéséhez.

Rendeltetészerű használat/Javallatok
A HydroTac transparent/-comfort egyáltalán nem vagy mérsékletten váladékozó, granulációs és hámosodási fázisban lévő sebek kezelésére alkalmas.

A HydroTac transparent/-comfort szakképzett személyzet használatra készült.

A sebkezelő szakember a kötözsecserét rábízhatja a betegre és/vagy a beteg hozzátartozóira (laikus személyzet feloglyelvte alatt).

Alkalmazási módszerek
A HydroTac transparent/-comfort kötözse méretét úgy válassza ki, hogy a sebpárna a seb szélein 1–2 cm-es túlnyúlóan. A HydroTac transparent szükség szerint egy steril ollóval méretre vághatja.
A HydroTac transparent comfort kötés felhelyezése előtt a környező bőr legyen száraz.

HydroTac transparent: Húzza le a fehér védőfóliát a számozásnak megfelelően (1., 2). Helyezze a HydroTac transparent-et a sebre, és rögzítse arra alkalmas másodlagos kötözőszerrel.

HydroTac transparent comfort: Húzza le a fehér védőfóliát a számozásnak megfelelően (1., 2), helyezze a sebre, és nyomja rá jól a ragasztós szegélyt. Eztán húzza le a védőrétegét a számozásnak megfelelően (3., 4).

A HydroTac transparent/-comfort a seben maradhat akár hét napon keresztül is. A váladék abszorpciója a kötés elszíneződése és/vagy felhólyagosodása formájában látható. A HydroTac transparent/-comfort kötést akkor kell lecserélni, ha a felhólyagosodás körülbelül elérte a sebterület méretét. Kötözsecsere alkalmával fogja meg a HydroTac transparent/-comfort egyik sarkát és óvatosan húzza le.

Ellenjavallatok
A HydroTac transparent/-comfort nem alkalmazható olyan betegeknél, akiknél a kötözse bármely összetevőjével szemben túlérzékenységi jól fenn. Ne alkalmazza klinikailag fertőzött sebre, valamint harmadfokú égési sérülés esetén.

Lehetséges mellékhatások
Mint minden más orvosi eszköz esetén, ennek a terméknek is lehetnek mellékhatásai, amelyek nem feltétlenül jelentkeznek mindenkinél.
A HydroTac transparent/-comfort általános mellékhatásai:

- Ritka esetekben a HydroTac transparent/-comfort lokális bőrreakciókat váltnat ki (irritáció, bőrreakciók, pl. pírosodás, megdagadás stb.).
- Ritka esetekben a HydroTac transparent/-comfort allergiás reakciót okozhat.

Ha itt nem felsorolt hatást észlel, forduljon az orvoshoz vagy a gyógyszerészhez.

Különleges biztonsági előírások
A nehezen gyógyuló sebek kezelése előtt a seb állapotának, illetve a sebgyógyulási zavarok okainak megfelelő orvosi orvosi szakvélemény szükséges.

A HydroTac transparent/-comfortral történő kezelés a sebgyógyulási zavarok okí terápiáját nem helyettesíti.

A HydroTac transparent/-comfort használatát nem tesztelték 5 év alatti gyermekeknél, terhes vagy szoptatós anyáknál. A kezelőorvosnak vagy a seb kezelését végző szakembernek gondosan kell eljárnia.

Általános utasítások
Tárolja 5–40 °C közötti hőmérsékleten. Gyermekektől elzárva tartandó!

A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2018-05.

- Egyszeri használatra
- Ne sterilizálja újra
- Ne használja fel, ha a csomagolás sérült
- Száraz helyen tárolandó

RU Инструкция по применению

Описание изделия
HydroTac transparent/-comfort — прозрачная гидрогелевая повязка из абсорбирующего гибкого полимера на основе смеси полиуретана и полимеризованных, которые содержит пропиленгликоль. Обратная сторона покрыта воздухопроницаемым, проплстстсующим проникновению влаги и микроорганизмов защитным слоем из полиуретана.

HydroTac transparent comfort дополнительно имеет самоклеящийся край, покрытый полиакрилатным клеем.

Свойства и принцип действия
HydroTac transparent/-comfort увлажняет рану и незначительно поглощает экссудат. Гидрогелевая повязка создает влажную среду в ране, что стимулирует процесс ее заживления. Повязка HydroTac transparent/-comfort прозрачна и обеспечивает атравматическую смену повязки.

Благодаря свойствам оценка состояния раны возможна в любое время без смены повязки.

С внутренней стороны повязка HydroTac transparent comfort дополнительно обрамлена защитной рамкой из клея клеящей пленкой, благодаря чему для ее фиксации не требуется использовать дополнительные материалы.

Использование по назначению/показания
Повязка HydroTac transparent/-comfort показана для лечения ран в фазе грануляции и эпителизации сухих и слабо экссудирующих ран.

Повязка HydroTac transparent/-comfort предназначается для применения специалистами по уходу за ранами. Специалисты по уходу за ранами могут делегировать смены повязки пациентам или их родственникам (применяемо не специалистами под контролем специалистов).

Указания по применению
Выберите повязку HydroTac transparent/-comfort соответственному размеру раны таким способом, чтобы повязка за край раны примерно на 1–2 см.
В случае необходимости повязку HydroTac transparent/-comfort можно обрезать стерильными ножницами.
Повязку HydroTac transparent comfort с самоклеящимся рантом следует накладывать только на сухую кожу вокруг раны.
HydroTac transparent: снимите белую защитную пленку согласно нумерации (1 и 2). Наложите повязку HydroTac transparent на рану и зафиксируйте при помощи подходящих материалов.
HydroTac transparent comfort: снимите белую защитную пленку согласно нумерации (1 и 2), наложите повязку на рану и хорошо прижмите клеящийся рант. Затем снимите защитный верхний слой согласно нумерации (3 и 4).

Повязку HydroTac transparent/-comfort можно оставлять до семи дней. При впитывании экссудата повязка мутнеет или/и пузырится. Повязку HydroTac transparent/-comfort следует сменить, когда пузырь на ней достигнет размера, приблизительно равного площади раны. Для смены повязки HydroTac transparent/-comfort отогните ее с одного угла и осторожно снимите.

Противопоказания
Повязку HydroTac transparent/-comfort нельзя применять для пациентов с непереносимостью любого из входящих в ее состав веществ. Не применять при клинически инфицированных ранах, а также при ожогах третьей степени.

Возможные побочные эффекты
Как и любое другое медицинское изделие, данная повязка может иметь необязательные побочные эффекты.
Распространенные побочные эффекты повязки HydroTac transparent/-comfort:

- В редких случаях повязка HydroTac transparent/-comfort может вызвать местную реакцию (раздражение, реакции со стороны кожи, например покраснение, отек).
- В редких случаях повязка HydroTac transparent/-comfort может вызвать аллергическую реакцию.

При обнаружении каких-либо не указанных здесь эффектов обратитесь к врачу или фармацевту.

Особые меры предосторожности
Каждый раз перед лечением плохо заживающих ран необходимо провести медицинское обследование с целью оценки состояния раны и выявления факторов, препятствующих ее заживлению.

Лечение с помощью повязки HydroTac transparent/-comfort эффективно поддерживает, но не может заменить лечение или устранение этих факторов.

Применение HydroTac transparent/-comfort у детей младше 5 лет, а также у беременных и кормящих женщин не изучено. Ваш лечащий врач или специалист по уходу за раной должны применять изделие с осторожностью.

Особые указания
Хранить при температуре от 5 до 40 °C. Беречь от детей.

Информация по состоянию на: 2018-05

- Запрет на повторное применение
- Не стерилизовать повторно
- Не использовать при повреждении упаковки
- Беречь от влаги

SE Bruksanvisning

Produktbeskrivning
HydroTac transparent/-comfort är ett transparent hydrogelförband som består av en absorberande polyuretan-polyeterpolyuretan/hydrodynamer som innehåller propylenglykol. Baksidan består av en polyuretanfilm som släpper igenom gaser men som är ogenomtränglig mot vätska och bakterier.

HydroTac transparent comfort är dessutom försett med en självhäftande kant som ytbehandlats med en halftmassa som innehåller polyakrylat.

Egenskaper och verkan
HydroTac transparent/-comfort kan avge fukt och i begränsad omfattning absorbera sekret. Hårigenom uppstår en fuktig särmiljö som verkar stimulerande på sårläkningen. HydroTac transparent/-comfort är transparent och fastnar inte i såret.

På grund av dessa egenskaper kan såret inspekteras utan att förbandet behöver bytas.

HydroTac transparent comfort är försett med en hudvänlig vidhäftningskant, varför inga ytterligare material behövs för fixering av förbandet.

Avsedd användning/Indikationer
HydroTac transparent/-comfort lämpar sig för behandling av sår under granulations- och epitelisationsfasen med ingen eller ring sekretion.

HydroTac transparent/-comfort är appliceras på såret av vårdpersonal. Sårvårdspersonalen kan överlåta förbandsbyte till patienten och/eller en anhörig (icke-personal under ledning av personal).

Dosering och användningsinformation
Välj rätt storlek på HydroTac transparent/-comfort så att sårdynan överlappar sårkanterna med ca 1–2 cm. HydroTac transparent kan vid behov klippas till lämplig storlek med en steril sax.
Omgivande hud bör vara torr innan du applicerar sårförbandet HydroTac transparent comfort med självhäftande kant.
HydroTac transparent: Dra av den vita skyddsfolien enligt numreringen (1 och 2). Placera HydroTac transparent på såret och fixera det med lämpligt material.
HydroTac transparent comfort: Dra av den vita skyddsfolien enligt numreringen (1 och 2) och applicera förbandet på såret. Tryck fast vidhäftningskanten ordentligt. Drag sedan av det övre skyddslagret enligt numreringen (3 och 4).
HydroTac transparent/-comfort kan lämnas kvar på sår i upp till sju dagar. Absorption av sekret syns som grumlighet och/eller blåsbildande områden på förbandet. Hydrotac transparent/-comfort bör bytas när blåsbildningen ungefär har nått samma storlek som sårområdet. När förbandet ska bytas lossas HydroTac transparent/-comfort lite i ett hörn och dras försiktigt av.

Kontraindikationer
HydroTac transparent/-comfort får inte användas på patienter som är överkänsliga mot något av innehållsämnena. Får inte användas om en klinisk infektion föreligger eller vid tredje gradens brännskador.

Möjliga biverkningar
I likhet med andra medicinska produkter kan den här produkten ge upphov till biverkningar, men alla behöver inte få dem.
Allmänna biverkningar av HydroTac transparent/-comfort:

- I sällsynta fall kan HydroTac transparent/-comfort orsaka lokal reaktion (irritation, hudreaktioner såsom rodnad och svullnad).
- I sällsynta fall kan HydroTac transparent/-comfort orsaka allergisk reaktion.

Om du upptäcker några biverkningar som inte anges här ska du kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Särskilda försiktighetsåtgärder
Före varje behandling av sår med dålig läkningstendens måste en läkare bedöma sårtillståndet och orsaken till den dåliga sårläkningen.

Sårvårdningen med HydroTac transparent/-comfort kan inte ersätta behandling av orsaken till den dåliga sårläkningen.

Användning av HydroTac transparent/-comfort på barn under 5 år, gravida och ammande kvinnor har inte fastställts. Behandlande läkare eller sårvårdspecialister bör iaktta försiktighet.

Allmänna instruktioner
Förvaras mellan 5 och 40 °C förvaras oåtkomligt för barn.

Datum för översyn av texten: 2018-05

- För engångsbruk
- Får inte omsterliseras
- Använd inte förbandet om förpackningen är bruten
- Förvaras torrt

HK 使用說明

產品說明
HydroTac transparent/-comfort 是一種包含吸水聚氨酯-聚醚混合物 (內含丙二醇) 的親水凝膠敷料。其背面是有一層透氣卻不容液體及細菌滲透的聚氨酯薄膜。
HydroTac transparent comfort 附加有一自黏圍邊，該圍邊上塗有一層聚丙烯酸酯黏劑。

特性及作用
HydroTac transparent/-comfort 能夠釋放出水份及有限度吸收分泌物。由於HydroTac transparent/-comfort 具有一個濕潤的環境，刺激及加速傷口的治癒能力。HydroTac transparent/-comfort 的透明敷料不會黏在傷口上。
基於這些特性，要了解傷口癒合情況時，不需更換敷料。
由於 HydroTac transparent/-comfort 有一自黏圍邊圍邊，因此無需附加使用敷料固定材料。

用途 / 適應症
HydroTac transparent/-comfort 適用於肉芽組織和上皮增生期的、不涉出或僅涉出少量滲出物的傷口。
HydroTac transparent/-comfort 只允許經由專業使用者數用。傷口護理專業人員可以將敷料更換委託給患者和/或其親屬 (非專業人員應在專業人員的督導之下更換敷料)。

使用方法
使用 HydroTac transparent/-comfort 前，請注意選擇敷料尺寸時要使敷料比傷口大約 1-2 厘米的傷口敷料-在需要時，可用一把已消毒剪刀裁剪 HydroTac transparent 敷料。
在敷貼有一自黏圍邊的 HydroTac transparent/-comfort 之前，用圍邊標記保護皮膚不受影響。
HydroTac transparent/-依據編號(1和2)撕去白色保護膜，將 HydroTac transparent 放置於傷口上並用適合的二類敷料材料固定好。
HydroTac transparent/-comfort:依據編號(1和2)撕去白色保護膜，將 HydroTac transparent 放置於傷口上並用適合的二類敷料材料固定好。
HydroTac transparent/-comfort:依據編號(1和2)撕去白色保護膜，將敷料放置於傷口上並將黏貼圍邊定好-再依據編號(3和4)撕去藍膜。
HydroTac transparent/-comfort 可以敷在傷口上長達七天。滲出物的吸收是清楚可見的，因為敷料會混濁和/或起泡。當起泡範圍大約達到傷口大小時，便更換 HydroTac transparent/-comfort。
HydroTac transparent/-comfort 敷料時，將 HydroTac transparent/-comfort 的一角輕輕揭起，小心撕去便可。

使用禁忌
如患者對 HydroTac transparent/-comfort 的某一種成份過敏，則勿使用 HydroTac transparent/-comfort。不可用於臨床感染及三級燒傷的傷口上。

可能不良反應
和其他醫療設備一樣，本產品可能會有副作用，但並非每個人都會發生。

- 在少數情況下，HydroTac transparent/-comfort 可能引起局部反應 (刺激、例如發紅、腫脹等的皮膚反應)。
- 在少數情況下，HydroTac transparent/-comfort 可能引起過敏反應。

如果您觀察到任何此處未列出的影響作用時，請諮詢您的醫師或藥劑師。

特別的預防措施
在治療患合不良的傷口前，必須請醫生對傷口情況和癒合不良的原因進行醫學評估。
另外，HydroTac transparent/-comfort 不能取代引致該傷口產生的成因之針對性治療。
對於 5 歲以下兒童、懷孕或哺乳期婦女，尚未建立 HydroTac transparent/-comfort 之使用方法。主治醫師或傷口護理專家應小心進行處理。

一般指示
儲存於 5°C 和 40°C 之間，應妥放在兒童拿不到的地方。

最近資料更新日期：2018-05

- 僅限單次使用
- 不可重複消毒
- 包裝破損時請勿使用本產品
- 保持乾燥

AE تعليمات الاستخدام

وصف المنتج
HydroTac transparent/-comfort هي ضمادة من هلام البولي يوريثان المائي المحتوية على بولي يوريثان مختلط البوليمر وبولي هيدروديناميكي، ويكون خلاياها من جلايكول بروبان، تُغطى الخلفة للغاز وغير مبلة للسوائل والبكتيريا.

علاوة على ذلك، فإن ضمادة HydroTac transparent comfort لديها حواف لاصقة، مغطاة بالأحرف على أكريلاتي.

الخواص والعمليل
بمقدور ضمادة HydroTac transparent/-comfort امتصاص كمية صغيرة من الإفرازات وهو ما يوفر بيئة رطبة تعزز عملية التئام الجلد. ضمادة HydroTac transparent/-comfort شفافة ولا يحدث أن تلتصق بالجرح. وبفضل هذه الخصائص يمكن الجرح في أي وقت دون تغيير الضمادة.

ولأن الضمادة HydroTac transparent comfort حواف لاصقة لطيفة على البشرة فلا حاجة لمواد أخرى لتثبيتها.

الاستخدام المقصود / مواضع الاستخدام
ضمادة HydroTac transparent/-comfort مناسبة لعلاج الجروح المتجاة أو محدودة النضوح في مراحل التحبب والتظهير.

ضمادة HydroTac transparent/-comfort مخصصة فقط للاستخدام المهني. ومع ذلك، يمكن لمتخصصي العناية بالجروح أن يعهدوا لعلاج الضمادة إلى المرضى وأو أقاربهم (غير المهنيين) تحت إشراف متخصصين.

طريقة الاستخدام
اختر مقاس ضمادة HydroTac transparent/-comfort بحيث تتجاوز حدود الجرح بحوالي 1 – 2 سم. يمكن قص ضمادة HydroTac transparent بالمقص المعقم، عند الحاجة.
يمكن ترك ضمادة HydroTac transparent/-comfort لمدة تصل إلى سبعة أيام. يتضح امتصاص الإفرازات بتغير اللون و/أو تجمع السائل أسفل الضمادة. يتحقق تغيير ضمادة HydroTac transparent/-comfort عندما يصبح حجم السائل المتجمع مساويًا تقريبًا لحجم الجرح. لإزالة ضمادة HydroTac transparent/-comfort، اسحب الضمادة الشفافة من إحدى الزوايا بحذر.

موانع الاستعمال
لا تُستخدم ضمادة HydroTac transparent/-comfort على المرضى الذين يعانون من حساسية تجاه أي من مكوناتها. لا تُعطى الضمادة على الجروح المتعاة بعدوى سريرية أو على الحروق من الدرجة الثالثة.

الآثار السلبية المحتملة
يمكن أن يحدث لبعض المرضى أعراض جانبية، وإن كانت لا تحدث للجميع.
الآثار الجانبية العامة لضمادة HydroTac transparent/-comfort:

- يمكن أن تسبب ضمادة HydroTac transparent/-comfort ردود فعل موضعية (تهيج، ردود فعل على الجلد، مثل: الاحمرار، التورم، والتهاب مثلاً).
- يمكن أن تسبب ضمادة HydroTac transparent/-comfort حدوث ردود فعل تحسسية نادرًا.

إذا لاحظت أيًا آخر غير تلك المذكورة هنا، فيرجى الرجوع إلى الطبيب المعالج أو طبيب الإيك.

احتياطات خاصة
يجب القيام، قبل معالجة الجروح وأساليب تأخير التئام أخرا ضروريًا على معالجة الجروح ضعيفة الالتئام.

HydroTac transparent/-comfort لا يمكن أن تحل المعالجة باستخدام الضمادة الشفافة محل المعالجة السببية.

لم يتم التحقق من استخدام ضمادة HydroTac transparent/-comfort في الأطفال دون 5 سنوات والحوامل والمرضعات. يجب أن يتوخى طبيب المعالج أو المختص بمداواة الجروح الحيطة والحذر.

تعليمات عامة
يُحفظ في درجة حرارة بين 5 و ٤٠° مئوية. يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

تاريخ آخر مراجعة للنص: 2018-05

- لا يُعاد تعقيم المنتج
- للاستعمال مرة واحدة فقط
- لا يستخدم إذا كانت العبوة تالفة
- يحفظ المنتج جافًا

KR 사용 설명서

제품 설명
HydroTac transparent/-comfort(하이드로젝 트랜스퍼런트/ 트랜스퍼런트 컴포트)는 프로필렌 글리콜이 함유된 흡수성 폴리우레탄-폴리우레아 하이브리드 폴리머 성분의 투명한 하이드로겔 드레싱 밴드입니다. 뒷면의 경우 액체와 병균으로 투과할 수 없으나 기체는 투과할 수 있는 폴리우레탄 필름으로 구성되어 있습니다.

또한 HydroTac transparent/-comfort 하이드로 트랜스퍼런트 컴포트에는 폴리아크릴레이트 접착제가 코팅된 접착 스트립이 있습니다.

속성 및 작용 기전
HydroTac transparent/-comfort는 수분을 방출하고 일정 양의 분비물을 흡수합니다. 이와 같이 상처에 습윤 환경을 조성하여 상처를 보다 빠르게 치유할 수 있습니다. HydroTac transparent/-comfort 는 투명하여 상처에 붙지 않을 수 있습니다.

이러한 속성 때문에 드레싱을 교체하지 않고도 상처를 항상 관찰할 수 있습니다.

용도/적응증
HydroTac transparent/-comfort는 육아조직 및 상피조직 형성 단계에 있는 미른 상처 또는 분비물이 약간 있는 상처의 치료에 적합합니다.

HydroTac transparent/-comfort는 전문 사용자용으로 제조되었습니다. 상처 치료 전문가는 드레싱 교체를 환자 및/또는 보호자(전문가의 지도를 받은 비전문가)에게 맡길 수 있습니다.

사용 방법
크기가 상처보다 1 – 2cm 정도 더 큰 HydroTac transparent/-comfort를 선택합니다. 필요한 경우 HydroTac transparent는 멸균된 가위로 잘라서 사용할 수 있습니다.
테두리에 접착성이 있는 드레싱 밴드인 HydroTac transparent comfort는 붙이기 전에 상처 주변의 피부를 건조시켜야 합니다.
HydroTac transparent: 흰색 보호막을 번호(1 & 2) 순서로 떼어냅니다. 드레싱을 상처에 붙이고 적절한 이차 드레싱 재료로 고정합니다.
HydroTac transparent/-comfort: 흰색 보호막을 번호(1 & 2) 순서로 떼어내고, 드레싱을 상처에 붙이고 접착 부분을 잘 눌러줍니다. 번호(3 & 4) 순서대로 상단 보호막을 떼어냅니다.

HydroTac transparent/-comfort는 최대 7일 동안 상처에 붙여둘 수 있습니다. 분비물이 흡수되면 드레싱이 뿌옇게 보이거나 물집이 생깁니다. 물집이 커지면 교체해야 합니다. HydroTac transparent/-comfort가 부풀어 올라 대략 상처 부위에 닿으면 이를 교체해야 합니다. 드레싱을 교체하려면 HydroTac transparent/-comfort의 한쪽 가장자리를 살짝 떼어낸 후 조심스럽게 제거합니다.

금기
HydroTac transparent/-comfort 성분에 대한 내성이 있는 환자의 경우 HydroTac transparent/-comfort 드레싱 밴드를 사용하지 마십시오. 임상 감염이 있는 상처 또는 3도 화상에는 사용하지 마십시오.

가능한 부작용
다른 의료 기기와 마찬가지로 이 제품에도 모든 사람에게 발생해서는 안 되는 부작용이 있을 수 있습니다.
HydroTac transparent/-comfort의 일반적인 부작용:

- 드물지만 HydroTac transparent/-comfort는 국소 반응(자극 또는 발적이나 붓기와 같은 피부 반응)을 일으킬 수 있습니다.
- 드물지만 HydroTac transparent/-comfort는 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다.

여기에 명기되지 않은 부작용이 발생할 경우에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

특별 주의사항
상처의 치유 상태에 이상이 있을 경우 드레싱을 하기 전에 상처의 상태와 치유 지연 원인에 대한 전문적인 검진을 받아야 합니다.

HydroTac transparent/-comfort를 이용해 치유하더라도 치유 장애의 근본 치료에 한계가 있습니다.

5세 미만의 어린이, 임산부 및 모유 수유 여성에게 HydroTac transparent/-comfort를 사용해도 충분히 알는 것으로 아직 확증되지 않았습니다. 이 경우 주치의 또는 상처 치료 전문가가 주의를 기울여야 합니다.

일반 지침
5–40°C의 온도에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

본 설명서의 개정 날짜: 2018년 5월

- 일회용
- 재소독하지 마십시오.
- 포장이 파손된 경우 사용하지 마십시오.
- 건조한 상태를 유지하십시오.

STERILE R