

D Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung

Omnistrip ist eine sterile Wundhaftstreifen zum Verschluss von kleinen Wunden und chirurgischen Incisionen. Er ist für die Verwendung durch medizinische Fachkräfte und Laienverwender vorgesehen.

Zusammensetzung

Omnistrip besteht aus einem Polyamid-Vlies in diskretem Farbton, das mit einem Polycrylat-Kleber beschichtet ist.

Zweckbestimmung

Omnistrip Wundhaftstreifen eignen sich für den Verschluss von kleinen, primär heilenden Wunden (Schnittwunden und Hautrissen), chirurgischen Incisionen und zur Unterstützung bzw. Stabilisierung generäter Wunden.

Das Produkt kann am Menschen auf geschädigter und intakter Haut durch medizinische Fachkräfte und Endverbraucher angewendet werden.

Kontraindikationen

Omnistrip eignet sich nicht zum Verschluss von sekundär heilenden Wunden. Auch bei infizierten, stark verschmutzten oder blutenden Wunden ist er nicht geeignet.

Besondere Vorsichtshinweise

Da keine Nachweise über schädliche Auswirkungen vorliegen und vor dem Hintergrund teilweise fehlender Erfahrungen mit der Verwendung dieses Produkts bei sensitiven Patientenpopulationen wie Sauglingen, Kindern, Schwangeren oder stillenden Frauen sollte das Produkt bei diesen Patientenpopulationen nur mit Vorsicht und aufgrund der Empfehlung eines Arztes verwendet werden.

Nebenwirkungen

Nebenwirkungen können bei Patienten auftreten, die auf eine der Komponenten allergisch oder empfindlich reagieren.

Anwendungshinweise (siehe Piktogramme 1 - 4)

Die Haut muss vor der Anwendung trocken und sauber sein. 1. Schutzpapier in der Mitte der Wundhaftstreifen abziehen.

2. Omnistrip an den äußeren Schutzpapieren greifen und rechtwinklig zu den Wundrändern auf der Wunde positionieren und andriicken. Achten Sie dabei darauf, dass die Wundhaftstreifen keine Dehnung ausgesetzt sind. 3. Auflegen Schutzpapiere nachdenken abziehen.

4. Wundhaftstreifen erneut andriicken.

Beim Abnehmen von Omnistrip ist darauf zu achten, dass beide Enden des Wundhaftstreifens zum Wundbereich hin abgezogen und dann vorsichtig hochgehoben werden.

Vor allem bei älterer oder verletzlicher Haut wird empfohlen, die Wundhaftstreifen vorsichtig abziehen.

Besondere Hinweise

Alternativ können die Wundhaftstreifen auch einzeln angebracht werden. Kreuzweises Überkleben wird nur an Gelenken oder Körperteilen empfohlen, die starker Beanspruchung durch Streckung und Dehnung ausgesetzt sind. Das Produkt muss gewechselt werden, wenn dies medizinisch angezeigt ist oder aber spätestens nach 7 Tagen. Es kann bis zu 3 mal direkt durch ein neues Produkt ersetzt werden.

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage. Vor dem Öffnen die Produktpackung sorgfältig auf Beschädigungen überprüfen. Das Produkt nicht verwenden, wenn sichtbare Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, z. B. Risse, Tunnel, Einstichlöcher oder ungleichmäßige, abgelöste, gerissene oder unvollständige Siegelung.

Produkteinlagerung

Um das potentielle Infektionsgefahr oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sollten die Wegwerfkomponenten von Omnistrip gemäß geltenden lokalen Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften und Standards zur Infektionsprävention entsorgt werden. Das Produkt ist mit dem normalen (Krankenhaus-) Müll zu entsorgen.

Meldung von Vorfallen

Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte); wenn während oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwereingeschlagenes Vorfallen aufgetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinen Bevollmächtigten und Ihren nationalen Behörde.

Stand der Information: 2024-05-27

DE – PAUL HARTMANN AG - 89522 HEIDENHEIM, GERMANY
AT – PAUL HARTMANN Ges.m.b.H. - 2355 Wiener Neudorf
CH – IWF HARTMANN AG - 822 Neuhengst

EN Instructions for use

Product description

Omnistrip ist eine sterile wound closure strip for the closure of minor wounds and surgical incisions. It is intended to be used by healthcare professionals and lay users.

Composition

Omnistrip is made of discreet coloured, non-woven polyamide fabric that is coated with a polycrylate adhesive.

Intended purpose

Omnistrip wound closure strips are intended for primary closure of minor wounds healing by first intention (cuts and lacerations), surgical incisions and for support and stabilization of sutured wounds.

The device can be used on humans on breached and intact skin by healthcare professionals and lay persons.

Contraindications

Omnistrip is not suitable for the closure of wounds healing by secondary intention. It is also not suitable for infected, heavily soiled or bleeding wounds.

Special precautions

In the absence of evidence of any harmful effects and in view of the partly limited experience with the use of this product on sensitive population groups such as infants, children, pregnant or nursing women the product should be used with caution following a clinician's recommendation.

Side effects

Adverse reactions may occur in patients who are allergic or hypersensitive to any of its components.

Mode of application (siehe Piktogramme 1 - 4)

The skin has to be dry and clean before application. 1. Peel off the middle section of the backing paper of the wound closure strips.

2. Hold the edges of Omnistrip using the outer backing papers and place on the wound at right angles to the incision and press into place. When doing so, make sure that the wound closure strips are not subjected to stretching.

3. Remove the external protective papers once at a time.

4. Press the wound closure strips down again.

When removing Omnistrip, make sure to pull each end towards the centre of the wound and then lift up carefully.

A careful removal of the wound closure strips is advised especially on elderly or vulnerable skin.

Special instructions

It is also possible to apply the strips singly. Crosswise application is recommended on joints or other parts of the body where the edges of the incision are subject to stretching and tension. The device can remain in place for up to 7 days depending on clinical assessment. It can immediately be replaced by a new device up to 3 times.

Reusing a single-use medical device is dangerous. Reprocessing devices, in order to reuse them, may seriously damage their integrity and their performance. Information available on request.

Before opening the product packaging, please take care for signs of damage. Do not use the product if there are visible signs of damage, such as cracks, channels, pinholes, or nonuniform, torn or incomplete seals.

Product disposal

In order to minimize the risk of potential infection hazards, or environmental pollution, disposable components of Omnistrip should follow disposal procedures according to applicable and local laws, rules, regulations and infection prevention standards. Dispose of the product together with regular (hospital) waste.

Incident reporting

For a patient/user/third party in the European Union and in countries with identical regulatory regime (Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices): if, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and/or its authorized representative and to your national authority.

Date of revision of the test: 2024-05-27

AU – PAUL HARTMANN Pty. Ltd. – Macquarie Park, NSW 2113

GB – PAUL HARTMANN Ltd. – Heywood Green Manchester OL10 2TT

ZA – HARTMANN South Africa - Northriding, Johannesburg, Gauteng

FR – Instructions d'utilisation

Description du produit

Omnistrip est une bandlette stérile de suture cutanée pour les plaies mineures et les incisions chirurgicales. Elle est destinée à être utilisée par toute personne, professionnelle de santé ou non.

Composition

Omnistrip est constitué d'un tissu polyamide légèrement coloré et non tissé, enduit d'un adhésif de polyacrylate.

Utilisation prévue

Les bandlettes de suture cutanée Omnistrip sont destinées à la suture primaire de plaies mineures pour une cicatrisation en première intention (coupures et lacerations), aux incisions chirurgicales et aux sutures.

Omnistrip est une bandlette stérile de suture cutanée pour les plaies mineures et les incisions chirurgicales. Elle est destinée à être utilisée par toute personne, professionnelle de santé ou non.

Contraindication

Omnistrip n'est pas adapté au fermeture des lésions secondaires. Il ne convient pas de l'utiliser sur des plaies infectées, ouvertes ou saignantes.

Précautions particulières

En l'absence de preuves d'effets nocifs et compte tenu de l'expérience en partie limitée de l'utilisation de ce produit par des groupes de populations sensibles tels que les nourrissons, les enfants ou les personnes épileptiques ou allaitantes, le produit doit être utilisé avec précaution selon les instructions d'un médecin.

Effets secondaires

Des effets indésirables peuvent survenir chez les patients allergiques ou hypersensibles à l'un de ses composants.

Mode d'application (voir pictogrammes 1 - 4)

La peau doit être sèche et propre avant l'application. 1. Décollez la partie centrale du papier support des bandlettes de suture cutanées.

2. Tenez les bords d'Omnistrip à l'aide des papiers supports extérieurs et placez-la sur la plaie, perpendiculairement à l'incision, et appuyez pour mettre en place. Pour cela, assurez-vous que les bandlettes de suture cutanées ne sont pas soumises à un étirement.

3. Retirez les papiers de protection externes un par un.

4. Appuyez sur le dessus des bandlettes de suture cutanées.

Lorsque vous retirez Omnistrip, veillez à tirer chaque extrémité vers le centre de la plaie, puis soulever délicatement.

Il est conseillé de retirer les bandlettes de suture cutanées avec précaution, en particulier sur les peaux matures ou fragiles.

Instructions particulières
Il est également possible d'appliquer les bandlettes séparément. L'application transversale est recommandée sur les articulations ou d'autres parties du corps où les bords d'incision sont soumis à des étirements et des tensions. Le dispositif peut rester sur la bandelette de suture cutanée jusqu'à 7 jours, selon l'évaluation clinique. Il peut être immédiatement remplacé par un nouveau dispositif jusqu'à 3 fois.

Omnistrip n'est pas adapté pour la chirurgie de fermeture à guérison pour seconde intention. Il ne convient pas de l'utiliser sur des plaies infectées ou contaminiées ou sanguinolentes.

Omnistrip n'est pas destiné à la clôture des plaies primaires qui garantissent une intégrité et une stabilité suffisante.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de populations sensibles comme neonats, bambins, donne et gravidae et/ou allaitantes.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de populations sensibles comme personnes âgées et personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Omnistrip n'est pas destiné à être utilisé avec des groupes de personnes ayant des problèmes de santé mentale.

RO Instrucțiuni de utilizare

Descrierea produsului
Omnistrip este un strip steril de închidere a plăgii, folosit pentru inchiderea plăgilor minore și a inciziei chirurgicale. Acesta este destinat utilizării atât de către profesioniștii din sănătate, cât și de persoane laice.

Compoziție
Omnistrip este realizat dintr-un material pe bază de poliamidă neșeuță, de culoare discretă, acoperit cu un strat de adeziv poliacrilat.

Scopul utilizării
Strupurile de inchidere a plăgilor Omnistrip sunt indicate pentru inchiderea primării a plăgilor minore, precum și a făclăi vindecărea de prima intenție (răfurii și lăzării), a inciziei chirurgicale și pentru fixarea și stabilizarea plăgilor surrate.

Dispozitivul poate fi utilizat pe piele umană afectată și neafecată, atât de către profesioniștii din sănătate, cât și de către utilizatori respescălăci.

Contraindicații
Omnistrip nu se utilizează pentru inchiderea plăgilor în cazul vindecării secundare. De asemenea, nu este indicat în cazul plăgilor infecțioase, excesiv de murdare sau hemoragice.

Măsuri speciale de precauție
În absența oricărui doară privat eventuală efecte nocive ale produsului și având în vedere experiența relativă limitată privind acesta produs la categoria sensibile de populație precum sugari, copii, femei însărcinate sau care alăptăază, produsul va fi utilizat cu atenție, respectând recomandările unui medic.

Reacții adverse
La pacienții care sunt alergici sau hipersensibili la oricare dintre componentele sale, pot apărea reacții adverse.

Mod de aplicare (consultati pictogramme 1 - 4)
Înainte de aplicare, pielea trebuie să fie uscată și curată.

1. Îndepărtați porunjele din mijloc și hârtie de protecție de pe stripurile pentru inchiderea plăgilor.

2. Îndepărtați marginile stripurilor Omnistrip, folosind hârtie exterioare de protecție, poziționând stripurile pe plăga înungui drept față de șase și fixați-le prin apăsare. Când procedați astfel, asigurați-vă că stripurile de inchidere a plăgilor nu sunt supuse întinderii.

3. Îndepărtați pe rând hârtie exterioare de protecție.

4. Presăpați din nou stripurile pentru inchiderea plăgilor.

La îndepărtarea stripurilor Omnistrip, este grijă să trageți fierare capăt spre centru plăgi, iar apoi să îndepărtați.

Se recomandă să îndepărtați stripurile pentru inchiderea plăgilor, în special în cazul pielii imbrăzăite sau vulnerabile.

Instrucțiuni speciale
De asemenea, stripurile pot fi aplicate unul către unul. În cazul articulațiilor sau al părților corpului unde marginile inițiale sunt supuse extensiei și tensiunii, este indicat aplicarea încrucișată.

Dispozitivul poate rămaști în stare de până la 7 zile, în funcție de evaluarea clinică. Poate fi înlocuit mediat sau cu dispozitiv, dar cel mult 3 zile.

Reutilizarea stripurilor de inchidere medicală este periculoasă. Reprocereaza dispozitivul, în scopul reziliutării, poate afecta grav integrarea și perfecționarea acestora. La cerere, sunt disponibile mai multe informații. Înainte de a deschide ambalajul produsului, verificați-vă că stripurile de inchidere a plăgilor nu sunt supuse întinderii.

Omnistrip nu este indicat pentru inchiderea plăgilor. La îndepărtarea stripurilor Omnistrip, este grijă să trageți fierare capăt spre centru plăgi, iar apoi să îndepărtați.

Se recomandă să îndepărtați stripurile pentru inchiderea plăgilor, în special în cazul pielii imbrăzăite sau vulnerabile.

Instrucțiuni speciale
De asemenea, stripurile pot fi aplicate unul către unul. În cazul articulațiilor sau al părților corpului unde marginile inițiale sunt supuse extensiei și tensiunii, este indicat aplicarea încrucișată.

Dispozitivul poate rămaști în stare de până la 7 zile, în funcție de evaluarea clinică. Poate fi înlocuit mediat sau cu dispozitiv, dar cel mult 3 zile.

Reutilizarea stripurilor de inchidere medicală este periculoasă. Reprocereaza dispozitivul, în scopul reziliutării, poate afecta grav integrarea și perfecționarea acestora. La cerere, sunt disponibile mai multe informații. Înainte de a deschide ambalajul produsului, verificați-vă că stripurile de inchidere a plăgilor nu sunt supuse întinderii.

Omnistrip nu este indicat pentru inchiderea plăgilor. La îndepărtarea stripurilor Omnistrip, este grijă să trageți fierare capăt spre centru plăgi, iar apoi să îndepărtați.

Se recomandă să îndepărtați stripurile pentru inchiderea plăgilor, în special în cazul pielii imbrăzăite sau vulnerabile.

Instrucțiuni speciale
De asemenea, stripurile pot fi aplicate unul către unul. În cazul articulațiilor sau al părților corpului unde marginile inițiale sunt supuse extensiei și tensiunii, este indicat aplicarea încrucișată.

Dispozitivul poate rămaști în stare de până la 7 zile, în funcție de evaluarea clinică. Poate fi înlocuit mediat sau cu dispozitiv, dar cel mult 3 zile.

Reutilizarea stripurilor de inchidere medicală este periculoasă. Reprocereaza dispozitivul, în scopul reziliutării, poate afecta grav integrarea și perfecționarea acestora. La cerere, sunt disponibile mai multe informații. Înainte de a deschide ambalajul produsului, verificați-vă că stripurile de inchidere a plăgilor nu sunt supuse întinderii.

Omnistrip nu este indicat pentru inchiderea plăgilor. La îndepărtarea stripurilor Omnistrip, este grijă să trageți fierare capăt spre centru plăgi, iar apoi să îndepărtați.

Se recomandă să îndepărtați stripurile pentru inchiderea plăgilor, în special în cazul pielii imbrăzăite sau vulnerabile.

Instrucțiuni speciale
De asemenea, stripurile pot fi aplicate unul către unul. În cazul articulațiilor sau al părților corpului unde marginile inițiale sunt supuse extensiei și tensiunii, este indicat aplicarea încrucișată.

Dispozitivul poate rămaști în stare de până la 7 zile, în funcție de evaluarea clinică. Poate fi înlocuit mediat sau cu dispozitiv, dar cel mult 3 zile.

Reutilizarea stripurilor de inchidere medicală este periculoasă. Reprocereaza dispozitivul, în scopul reziliutării, poate afecta grav integrarea și perfecționarea acestora. La cerere, sunt disponibile mai multe informații. Înainte de a deschide ambalajul produsului, verificați-vă că stripurile de inchidere a plăgilor nu sunt supuse întinderii.

Omnistrip nu este indicat pentru inchiderea plăgilor. La îndepărtarea stripurilor Omnistrip, este grijă să trageți fierare capăt spre centru plăgi, iar apoi să îndepărtați.

Se recomandă să îndepărtați stripurile pentru inchiderea plăgilor, în special în cazul pielii imbrăzăite sau vulnerabile.

Instrucțiuni speciale
De asemenea, stripurile pot fi aplicate unul către unul. În cazul articulațiilor sau al părților corpului unde marginile inițiale sunt supuse extensiei și tensiunii, este indicat aplicarea încrucișată.

Dispozitivul poate rămaști în stare de până la 7 zile, în funcție de evaluarea clinică. Poate fi înlocuit mediat sau cu dispozitiv, dar cel mult 3 zile.

Reutilizarea stripurilor de inchidere medicală este periculoasă. Reprocereaza dispozitivul, în scopul reziliutării, poate afecta grav integrarea și perfecționarea acestora. La cerere, sunt disponibile mai multe informații. Înainte de a deschide ambalajul produsului, verificați-vă că stripurile de inchidere a plăgilor nu sunt supuse întinderii.

Omnistrip nu este indicat pentru inchiderea plăgilor. La îndepărtarea stripurilor Omnistrip, este grijă să trageți fierare capăt spre centru plăgi, iar apoi să îndepărtați.

Se recomandă să îndepărtați stripurile pentru inchiderea plăgilor, în special în cazul pielii imbrăzăite sau vulnerabile.

Instrucțiuni speciale
De asemenea, stripurile pot fi aplicate unul către unul. În cazul articulațiilor sau al părților corpului unde marginile inițiale sunt supuse extensiei și tensiunii, este indicat aplicarea încrucișată.

Dispozitivul poate rămaști în stare de până la 7 zile, în funcție de evaluarea clinică. Poate fi înlocuit mediat sau cu dispozitiv, dar cel mult 3 zile.

Reutilizarea stripurilor de inchidere medicală este periculoasă. Reprocereaza dispozitivul, în scopul reziliutării, poate afecta grav integrarea și perfecționarea acestora. La cerere, sunt disponibile mai multe informații. Înainte de a deschide ambalajul produsului, verificați-vă că stripurile de inchidere a plăgilor nu sunt supuse întinderii.

Omnistrip nu este indicat pentru inchiderea plăgilor. La îndepărtarea stripurilor Omnistrip, este grijă să trageți fierare capăt spre centru plăgi, iar apoi să îndepărtați.

Se recomandă să îndepărtați stripurile pentru inchiderea plăgilor, în special în cazul pielii imbrăzăite sau vulnerabile.

Instrucțiuni speciale
De asemenea, stripurile pot fi aplicate unul către unul. În cazul articulațiilor sau al părților corpului unde marginile inițiale sunt supuse extensiei și tensiunii, este indicat aplicarea încrucișată.

Dispozitivul poate rămaști în stare de până la 7 zile, în funcție de evaluarea clinică. Poate fi înlocuit mediat sau cu dispozitiv, dar cel mult 3 zile.

Reutilizarea stripurilor de inchidere medicală este periculoasă. Reprocereaza dispozitivul, în scopul reziliutării, poate afecta grav integrarea și perfecționarea acestora. La cerere, sunt disponibile mai multe informații. Înainte de a deschide ambalajul produsului, verificați-vă că stripurile de inchidere a plăgilor nu sunt supuse întinderii.

Omnistrip nu este indicat pentru inchiderea plăgilor. La îndepărtarea stripurilor Omnistrip, este grijă să trageți fierare capăt spre centru plăgi, iar apoi să îndepărtați.

Se recomandă să îndepărtați stripurile pentru inchiderea plăgilor, în special în cazul pielii imbrăzăite sau vulnerabile.

Poruncire de zapletă

Za pacienta/împotriva/treto obozno în drăgușii cu identic regulativu udrutiv (Ureda (F) 2017/745 om medicinsk pripomikhi); ce med uporab tepe pripomikha ali zaradi neuporab pride de resnega zapleta, o tem obvestite pripovjala in/ali pooblašenega zastopnika ter pristoni državni organ.

Datum zadnje revizije: 2024-05-27

SI – PAUL HARTMANN ScandCare AB - 13342 Anderstorp

RS Upstisu za upotrebu

Opis proizvoda

Omnistrip je strelina traka za zatvaranje rană koja se koristi za zatvaranje manjih rană i hirurških rezava. Namjenjen je za upotrebu od strane zdravstvenih radnika i konsnika koji nisu medicinski stručnjaci.

Sastav

Omnistrip je izrađen od netkanog poliamidnog materijala diskretne boje, koji je obložen poliakrilatom lepkom.

Namens

Omnistrip se koristi za zatvaranje ranu predviđene su za primarno zatvaranje manjih rană i hirurških rezava. Namjenjen je za upotrebu od strane zdravstvenih radnika i konsnika koji nisu medicinski stručnjaci.

Tiskišet na zapletu

Omnistrip se preporučuje za zatvaranje ranu koje se zaceljuju u nepravilnim stazama i tenu. Profesionalni su i ostale komponente sastavne sastavnice.

Kontraindikacija

Omnistrip se ne upotrebljava za zatvaranje plăgih u kazul vindecione. De asemenea, nu este indicat în cazul plăgih infecțioase, excesiv de murdare sau hemoragice.

Măsuri speciale de precauție

În absența oricărui doară privat eventuală efecte nocive ale produsului și având în vedere experiența relativă limitată privind acesta produs la categoria sensibile de populație precum sugari, copii, femei însărcinate sau care alăptăază, produsul va fi utilizat cu atenție, respectând recomandările unui medic.

Reacții adverse

La pacienții care sunt alergici sau hipersensibili la oricare dintre componentele sale, pot apărea reacții adverse.

Mod de aplicare (consultati pictogramme 1 - 4)

Înainte de aplicare, pielea trebuie să fie uscată și curată.

1. Îndepărtați porunjele din mijloc și hârtie de protecție de pe stripurile pentru inchiderea plăgilor.

2. Îndepărtați marginile stripurilor Omnistrip, folosind hârtie exterioare de protecție, poziționând stripurile pe plăga înungui drept față de șase și fixați-le prin apăsare. Când procedați astfel, asigurați-vă că stripurile de inchidere a plăgilor nu sunt supuse întinderii.

3. Îndepărtați pe rând hârtie exterioare de protecție.

4. Presăpați din nou stripurile pentru inchiderea plăgilor.

La îndepărtarea stripurilor Omnistrip, este grijă să trageți fierare capăt spre centru plăgi, iar apoi să îndepărtați.

Se recomandă să îndepărtați stripurile pentru inchiderea plăgilor, în special în cazul pielii imbrăzăite sau vulnerabile.

Instrucțiuni speciale
De asemenea, stripurile pot fi aplicate unul către unul. În cazul articulațiilor sau al părților corpului unde marginile inițiale sunt supuse extensiei și tensiunii, este indicat aplicarea încrucișată.

Dispozitivul poate rămaști în stare de până la 7 zile, în funcție de evaluarea clinică. Poate fi înlocuit mediat sau cu dispozitiv, dar cel mult 3 zile.

Reutilizarea stripurilor de inchidere medicală este periculoasă. Reprocereaza dispozitivul, în scopul reziliutării, poate afecta grav integrarea și perfecționarea acestora. La cerere, sunt disponibile mai multe informații. Înainte de a deschide ambalajul produsului, verificați-vă că stripurile de inchidere a plăgilor nu sunt supuse întinderii.

Omnistrip nu este indicat pentru inchiderea plăgilor. La îndepărtarea stripurilor Omnistrip, este grijă să trageți fierare capăt spre centru plăgi, iar apoi să îndepărtați.

Se recomandă să îndepărtați stripurile pentru inchiderea plăgilor, în special în cazul pielii imbrăzăite sau vulnerabile.

Instrucțiuni speciale
De asemenea, stripurile pot fi aplicate unul către unul. În cazul articulațiilor sau al părților corpului unde marginile inițiale sunt supuse extensiei și tensiunii, este indicat aplicarea încrucișată.

Dispozitivul poate rămaști în stare de până la 7 zile, în funcție de evaluarea clinică. Poate fi înlocuit mediat sau cu dispozitiv, dar cel mult 3 zile.

Reutilizarea stripurilor de inchidere medicală este periculoasă. Reprocereaza dispozitivul, în scopul reziliutării, poate afecta grav integrarea și perfecționarea acestora. La cerere, sunt disponibile mai multe informații. Înainte de a deschide ambalajul produsului, verificați-vă că stripurile de inchidere a plăgilor nu sunt supuse întinderii.

Omnistrip nu este indicat pentru inchiderea plăgilor. La îndepărtarea stripurilor Omnistrip, este grijă să trageți fierare capăt spre centru plăgi, iar apoi să îndepărtați.

Se recomandă să îndepărtați stripurile pentru inchiderea plăgilor, în special în cazul pielii imbrăzăite sau vulnerabile.

Instrucțiuni speciale
De asemenea, stripurile pot fi aplicate unul către unul.